

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)



PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:
Jean COTTERET
Alain LAGRANGE

Serial No.: 10/735,524


Filed: December 12, 2003

For: DYEING COMPOSITION COMPRISING
A CATIONIC TERTIARY PARA-
PHENYLENEDIAMINE AND A
POLYMER CONTAINING A FATTY
CHAIN, METHODS AND USES

Group Art Unit: 1751

Examiner: Unknown

Atty. Dkt. No.: LORE:003US

CERTIFICATE OF MAILING 37 C.F.R. 1.8	
I hereby certify that this correspondence is being deposited with the U.S. Postal Service with sufficient postage as First Class Mail in an envelope addressed to: MS MISSING PARTS, Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, on the date below:	
June 24, 2004	
Date	Steven L. Highlander

**SUBMISSION OF FOREIGN PRIORITY DOCUMENT AND
CLAIM FOR FOREIGN PRIORITY PURSUANT TO 37 C.F.R. § 1.55**

MS MISSING PARTS
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450


Sir:

Applicants respectfully claim priority to French Patent Application No. 0215766, filed December 13, 2002, for the above-referenced application and submit herewith a certified copy of the French priority patent application.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

It is believed that no fee is due with this communication, however, should any fees under 37 C.F.R. §§ 1.16 to 1.21 be required for any reason relating to the enclosed document, the Commissioner is authorized to deduct or credit said fees from or to Fulbright & Jaworski Deposit Account No. 50-1212/LORE:003US.

Respectfully submitted,


Steven L. Highlander
For Mark B. Wilson Ref No. 37,642
Reg. No. 37,259
Attorney for Applicants

FULBRIGHT & JAWORSKI L.L.P.
600 Congress Avenue, Suite 2400
Austin, Texas 78701
(512) 474-5201

Date: June 24, 2004

THIS PAGE BLANK (USPTO)

0215700
Pascale
(2)

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le **31 OCT. 2003**

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

THIS PAGE BLANK (USPTO)



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

cerfa
N° 11354*02

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

BR1

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 G W / 010501

13 DEC 2002 REMIS DES PIÈCES DATE 13 INPI PARIS LIEU 0215766 N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 13 DEC. 2002		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE Bureau D.A. CASALONGA - JOSSE 8, avenue Percier 75008 PARIS	
Vos références pour ce dossier (facultatif) B 02/3488 FR-SE OA 02432			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
2 NATURE DE LA DEMANDE Demande de brevet <input checked="" type="checkbox"/> Demande de certificat d'utilité <input type="checkbox"/> Demande divisionnaire <input type="checkbox"/> <i>Demande de brevet initiale</i> N° _____ Date _____ <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i> N° _____ Date _____ Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i> <input type="checkbox"/> N° _____ Date _____		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Composition tinctoriale comprenant une paraphénylènediamine tertiaire cationique et un polymère à chaîne grasse, procédés et utilisations.			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases) <input type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique		L'ORÉAL	
Nom ou dénomination sociale			
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN		_____	
Code APE-NAF		_____	
Domicile ou siège	Rue	14, rue Royale	
	Code postal et ville	75008 PARIS	
	Pays	FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)		<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	

Remplir impérativement la 2^{ème} page



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 2/2

BR2

13 DEC 2002 REMISE DES PIÈCES DATE 15 INPI PARIS LIEU 0215766 N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		0215766 B 02/3488fr-SE OA 02432	
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>		B 02/3488fr-SE OA 02432	
6 MANDATAIRE <i>(s'il y a lieu)</i>			
Nom			
Prénom			
Cabinet ou Société		Bureau D.A. CASALONGA - JOSSE	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	8, avenue Percier	
	Code postal et ville	75 008 PARIS	
	Pays		
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>			
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>			
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>			
7 INVENTEUR (S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques	
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> Établissement immédiat <input type="checkbox"/> Établissement différé	
Paiement échelonné de la redevance <i>(en deux versements)</i>		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention <i>(joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence)</i> : AG [] [] [] [] []	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI	
Axel CASALONGA, 6m 92 1044 i Conseil en Propriété Industrielle			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

**COMPOSITION TINCTORIALE COMPRENANT UNE
PARAPHÉNYLÈNEDIAMINE TERTIAIRE CATIONIQUE ET UN
POLYMÈRE À CHAÎNE GRASSE, PROCÉDÉS ET
UTILISATIONS**

5

La présente demande a pour objet une composition tinctoriale pour la teinture des fibres kératiniques, en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, comprenant dans un milieu de teinture approprié au moins une paraphénylènediamine tertiaire cationique contenant un noyau pyrrolidinique, et au moins un polymère à chaîne grasse particulier.

10

L'invention a aussi pour objet l'utilisation de cette composition pour la teinture des fibres kératiniques ainsi que le procédé de teinture mettant en œuvre cette composition.

15

Il est connu de teindre les fibres kératiniques et en particulier les cheveux humains avec des compositions tinctoriales contenant des précurseurs de colorant d'oxydation, appelés généralement bases d'oxydation, tels que des ortho ou paraphénylènediamines, des ortho ou paraaminophénols et des composés hétérocycliques. Ces bases d'oxydation sont des composés incolores ou faiblement colorés qui, associés à des produits oxydants, peuvent donner naissance par un processus de condensation oxydative à des composés colorés.

20

On sait également que l'on peut faire varier les nuances obtenues avec ces bases d'oxydation en les associant à des coupleurs ou modificateurs de coloration, ces derniers étant choisis notamment parmi les métadiamines aromatiques, les métaaminophénols, les métadiphénols et certains composés hétérocycliques tels que des composés indoliques.

25

La variété des molécules mises en jeu au niveau des bases d'oxydation et des coupleurs, permet l'obtention d'une riche palette de couleurs.

30

La coloration dite "permanente" obtenue grâce à ces colorants d'oxydation, doit par ailleurs satisfaire un certain nombre d'exigences. Ainsi, elle doit être sans inconvénient sur le plan toxicologique, elle

doit permettre d'obtenir des nuances dans l'intensité souhaitée et présenter une bonne tenue face aux agents extérieurs tels que la lumière, les intempéries, le lavage, les ondulations permanentes, la transpiration et les frottements.

5 Les colorants doivent également permettre de couvrir les cheveux blancs, et être enfin les moins sélectifs possibles, c'est-à-dire permettre d'obtenir des écarts de coloration les plus faibles possibles tout au long d'une même fibre kératinique, qui est en général différemment sensibilisée (i.e. abîmée) entre sa pointe et sa racine.

10 Il a déjà été proposé dans la demande de brevet WO 02/45675 d'utiliser des compositions de teintures d'oxydation des fibres kératiniques comprenant une paraphénylènediamine tertiaire cationique contenant un noyau pyrrolidinique.

15 Ces paraphénylènediamines tertiaires cationiques contenant un noyau pyrrolidinique conduisent à des compositions qui présentent une innocuité généralement considérée comme meilleure que les compositions contenant des paraphénylènediamines classiques. Cependant les nuances obtenues lorsqu'on utilise ces compositions sont nettement moins puissantes et nettement plus sélectives, c'est-à-dire que les teintures obtenues présentent des variations de colorations importantes en fonction du degré de sensibilisation des différents cheveux ou des différentes zones d'un même cheveu. La ténacité de ces nuances peut aussi varier fortement suivant le degré de sensibilisation. En outre, les colorations obtenues sont également souvent plus grises, c'est-à-dire moins chromatiques.

20 De manière surprenante et avantageuse, la Demanderesse vient de découvrir qu'il est possible d'obtenir de nouvelles compositions pour la teinture des fibres kératiniques, en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, capables de pallier les inconvénients cités ci-dessus et notamment de conduire à des colorations aux nuances variées, chromatiques, puissantes, esthétiques, peu sélectives et résistant bien aux diverses agressions que peuvent subir les fibres, en associant au sein d'une composition, au moins une paraphénylènediamine tertiaire cationique contenant un noyau

pyrrolidinique et au moins un polymère à chaîne grasse particulier. En outre, ces compositions présentent un bon profil toxicologique.

5 L'invention a donc pour objet une composition tinctoriale pour la teinture des fibres kératiniques comprenant dans un milieu approprié pour la teinture au moins une paraphénylènediamine tertiaire cationique à noyau pyrrolidinique particulier et au moins un polymère à chaîne grasse tel que défini ci-après.

10 L'invention a aussi pour objet un procédé de teinture mettant en œuvre cette composition ainsi qu'un dispositif à plusieurs compartiments ou "kit" de teinture.


Un autre objet de l'invention est l'utilisation de la composition de la présente invention pour la teinture des fibres kératiniques, en particulier les fibres kératiniques humaines telles que les cheveux.

15 La composition de la présente invention permet en particulier d'obtenir une coloration de fibres kératiniques chromatique, très puissante, peu sélective et tenace tout en évitant la dégradation de ces fibres.

20 Au sens de la présente invention, on entend par paraphénylènediamine tertiaire cationique contenant un noyau pyrrolidinique, une paraphénylènediamine possédant un groupement NH_2 et en para de celui-ci une fonction amine di-substituée dont les substitutions forment avec l'atome d'azote un noyau pyrrolidinique, la molécule possédant au moins un atome d'azote quaternisé.

25 Dans le cadre de la présente invention, on entend par alkyle, des radicaux linéaires ou ramifiés par exemple méthyle, éthyle, n-propyle, iso-propyle, butyle, etc. Un radical alcoxy est un radical alk-O , le radical alkyle ayant la définition donnée ci dessus. Halogène désigne de préférence Cl, Br, I, F.

30 Parmi les paraphénylènediamines tertiaires cationiques contenant un noyau pyrrolidinique utilisables dans la composition selon la présente invention, on peut notamment citer les composés de formule (I) suivante et leurs sels d'addition



dans laquelle

• n varie de 0 à 4, étant entendu que lorsque n est supérieur ou égal à 2
5 alors les radicaux R_1 peuvent être identiques ou différents,

• R_1 représente un atome d'halogène ; une chaîne hydrocarbonée en C_1 - C_6 , aliphatique ou alicyclique, saturée ou insaturée, la chaîne pouvant
10 contenir un ou plusieurs atomes d'oxygène, d'azote, de silicium, de soufre ou un groupement SO_2 , et pouvant être substituée par un ou plusieurs radicaux hydroxy ou amino ; un radical onium Z, le radical R_1 ne comportant pas de liaison peroxyde, ni de radicaux diazo, nitro ou nitroso ,

R_2 représente un radical onium Z ou un radical $-X-C=NR_8-NR_9R_{10}$
15 dans lequel X représente un atome d'oxygène ou un radical $-NR_{11}$ et R_8 , R_9 , R_{10} et R_{11} représentent un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C_1 - C_4 ou un radical hydroxyalkyle en C_1 - C_4 ,

R_3 représente un atome d'hydrogène ou un radical hydroxy.


Onium désigne un radical quaternaire d'une base azotée.

20 A titre d'exemple, R_1 peut être un atome de chlore, un radical méthyle, éthyle, isopropyle, vinyle, allyle, méthoxyméthyle, hydroxyéthyle, 1-carboxyméthyle, 1-aminométhyle, 2-carboxyéthyle, 2-hydroxyéthyle, 3-hydroxypropyle, 1,2-dihydroxyéthyle, 1-hydroxy-2-aminoéthyle, 1-amino-2-hydroxyéthyle, 1,2- diaminoéthyle, méthoxy, éthoxy, allyloxy, 2-hydroxyéthoxy.

En particulier, n est égal à 0.

Dans la formule (I), lorsque n est égal à 1, R₁ est de préférence un atome d'halogène ; une chaîne hydrocarbonée en C₁-C₆, aliphatique ou alicyclique, saturée ou insaturée, un ou plusieurs atomes de carbone pouvant être remplacés par un atome d'oxygène, d'azote, de silicium, de soufre, par un groupement SO₂, le radical R₁ ne comportant pas de liaison peroxyde, ni de radicaux diazo, nitro ou nitroso. De préférence, R₁ est choisi parmi le chlore, le brome, les radicaux alkyles en C₁-C₄, hydroxyalkyles en C₁-C₄, aminoalkyles en C₁-C₄, alcoxy en C₁-C₄, hydroxyalcoxy en C₁-C₄. A titre d'exemple, R₁ est choisi parmi un radical méthyle, hydroxyméthyle, 2-hydroxyéthyle, 1,2-dihydroxyéthyle, méthoxy, isopropoxy, 2-hydroxyéthoxy.

Le radical R₂ de la formule (I) est selon un mode de réalisation particulier le radical onium Z correspondant à la formule (II)



dans laquelle

- D est une simple liaison ou une chaîne alkylène en C₁-C₁₄, linéaire ou ramifiée pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi l'oxygène, le soufre ou l'azote, et pouvant être substituée par un ou plusieurs radicaux hydroxyle, alcoxy en C₁-C₆ ou amino, et pouvant porter une ou plusieurs fonctions cétone ;

- R_4 , R_5 et R_6 , pris séparément, représentent un radical alkyle en C_1-C_{15} ; un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 ; un radical alcoxy(C_1-C_6)alkyle en C_1-C_6 ; un radical aryle ; un radical benzyle ; un radical amidoalkyle en C_1-C_6 ; un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 ; un radical aminoalkyle en C_1-C_6 ; un radical aminoalkyle en C_1-C_6 dont l'amine est mono- ou di-substituée par un radical alkyle en C_1-C_4 , alkyl(C_1-C_6)carbonyle, amido ou alkyl(C_1-C_6)sulfonyle ; ou
- R_4 , R_5 et R_6 ensemble, deux à deux, forment, avec l'atome d'azote auxquels ils sont rattachés, un cycle saturé carboné à 4, 5, 6 ou 7 chaînons pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes tel que par exemple un cycle azétidine, un cycle pyrrolidine, un cycle pipéridine, un cycle pipérazine ou un cycle morpholine, le cycle cationique pouvant être substitué par un atome d'halogène, un radical hydroxyle, un radical alkyle en C_1-C_6 , un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 , un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 , un radical alcoxy en C_1-C_6 , un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 , un radical amido, un radical carboxyle, un radical alkyl(C_1-C_6)carbonyl, un radical thio (-SH), un radical thioalkyle (-R-SH) en C_1-C_6 , un radical alkyl(C_1-C_6)thio, un radical amino, un radical amino mono ou disubstitué par un radical alkyl(C_1-C_6), alkyl(C_1-C_6)carbonyle, amido ou alkyl(C_1-C_6)sulfonyle ;
- R_7 représente un radical alkyle en C_1-C_6 ; un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 ; un radical aryle ; un radical benzyle ; un radical aminoalkyle en C_1-C_6 ; un radical aminoalkyle en C_1-C_6 dont l'amine est mono- ou di-substituée par un radical alkyl(C_1-C_6), alkyl(C_1-C_6)carbonyle, amido ou alkyl(C_1-C_6)sulfonyle ; un radical carboxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical carbamylalkyle en C_1-C_6 ; un radical trifluoroalkyle en C_1-C_6 ; un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 ; un radical sulfonamidoalkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)carboxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)sulfinylalkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)sulfonylalkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)carbonylalkyle en C_1-C_6 ; un radical N-alkyl(C_1-C_6)carbamylalkyle en C_1-C_6 ; un radical N-alkyl(C_1-C_6)sulfonamidoalkyle en C_1-C_6 ;

- x est 0 ou 1,

- lorsque $x = 0$, alors le bras de liaison est rattaché à l'atome d'azote portant les radicaux R_4 à R_6 ,

- 5 - lorsque $x = 1$, alors deux des radicaux R_4 à R_6 forment conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont rattachés un cycle saturé à 4, 5, 6 ou 7 chaînons et D est lié à un atome de carbone du cycle saturé ;

- Y est un contre ion.

- 10 Dans la formule (II), lorsque x est égal à 0, alors R_4 , R_5 et R_6 séparément sont choisis de préférence parmi un radical alkyle en C_1-C_6 , un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_4 , un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_4 , un radical alcoxy(C_1-C_6)alkyle en C_1-C_4 , un radical amidoalkyle en C_1-C_6 , un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 , ou R_4 avec R_5 forment ensemble un cycle azétidine, un cycle pyrrolidine, pipéridine,
- 15 pipérazine, morpholine, R_6 étant choisi dans ce cas parmi un radical alkyle en C_1-C_6 ; un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 ; un radical aminoalkyle en C_1-C_6 , un radical aminoalkyle mono ou disubstitué par un radical alkyl(C_1-C_6), alkyl(C_1-C_6)carbonyle, amido ou alkyl(C_1-C_6)sulfonyle ; un radical
- 20 carbamylalkyle en C_1-C_6 ; un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)carboxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)carbonylalkyle en C_1-C_6 ; un radical N-alkyl(C_1-C_6)carbamylalkyle en C_1-C_6 .


- 25 Lorsque x est égal à 1, alors R_7 est de préférence choisi parmi un radical alkyle en C_1-C_6 ; un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 ; un radical aminoalkyle en C_1-C_6 , un radical aminoalkyle en C_1-C_6 dont l'amine est mono ou disubstituée par un radical alkyl(C_1-C_6), alkyl(C_1-C_6)carbonyle, amido ou alkyl(C_1-C_6)sulfonyle ; un radical carbamylalkyle en C_1-C_6 ; un radical
- 30 trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)carboxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)carbonylalkyle en C_1-C_6 ; un radical N-alkyl(C_1-C_6)carbamylalkyle en C_1-C_6 ; R_4 avec R_5 ensemble forment un cycle azétidine, pyrrolidine, pipéridine, pipérazine, morpholine, R_6 étant choisi dans ce cas parmi un radical alkyle en C_1-C_6 ;

un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 ; un radical aminoalkyle en C_1-C_6 , un radical aminoalkyle en C_1-C_6 dont l'amine est mono ou disubstituée par un radical alkyl(C_1-C_6), alkyl(C_1-C_6)carbonyle, amido ou alkyl(C_1-C_6)sulfonyle ; un radical carbamylalkyle en C_1-C_6 ; un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)carboxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)carbonylalkyle en C_1-C_6 ; un radical N-alkyl(C_1-C_6)carbamylalkyle en C_1-C_6 .

Dans la formule (II), D est de préférence une simple liaison ou une chaîne alkylène pouvant être substituée.

Lorsque le radical R_2 correspond à la formule (II), il est de préférence un radical trialkylammonium dont les radicaux alkyles peuvent être substitués.

Selon un deuxième mode de réalisation, le radical R_2 représente le radical onium Z correspondant à la formule (III)



(III)

dans laquelle

- D est une simple liaison ou une chaîne alkylène en C_1-C_{14} , linéaire ou ramifiée pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi l'oxygène, le soufre ou l'azote, et pouvant être substituée

par un ou plusieurs radicaux hydroxyle, alcoxy en C_1-C_6 ou amino, et pouvant porter une ou plusieurs fonctions cétone;

• les sommets E, G, J, L, identiques ou différents, représentent un atome de carbone, d'oxygène, de soufre ou d'azote pour former un cycle pyrrolique, pyrazolique, imidazolique, triazolique, oxazolique, isooxazolique, thiazolique, isothiazolique,

• q est un nombre entier compris entre 0 et 4 inclus ;

• o est un nombre entier compris entre 0 et 3 inclus ;

• $q+o$ est un nombre entier compris entre 0 et 4 ;

• les radicaux R_8 , identiques ou différents, représentent un atome d'halogène, un radical hydroxyle, un radical alkyle en C_1-C_6 , un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 , un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 , un radical alcoxy en C_1-C_6 , un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 , un radical amido, un radical carboxyle, un radical alkylcarbonyle en C_1-C_6 , un radical thio, un radical thioalkyle en C_1-C_6 , un radical alkyl(C_1-C_6)thio, un radical amino, un radical amino mono- ou di-substitué par un radical alkyl(C_1-C_6), alkyl(C_1-C_6)carbonyle, amido, alkyl(C_1-C_6)sulfonyle ; un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 ou un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 ; étant entendu que les radicaux R_8 sont portés par un atome de carbone,

• les radicaux R_9 , identiques ou différents, représentent un radical alkyle en C_1-C_6 , un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 , un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 , un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 , un radical alcoxy(C_1-C_6)alkyle en C_1-C_6 , un radical carbamylalkyle C_1-C_6 , un radical alkyl(C_1-C_6)carboxyalkyle en C_1-C_6 , un radical benzyle ; étant entendu que les radicaux R_9 sont portés par un azote,

• R_{10} représente un radical alkyle en C_1-C_6 ; un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 ; un radical aryle ; un radical benzyle ; un radical aminoalkyle en C_1-C_6 , un radical aminoalkyle en C_1-C_6 dont l'amine est substituée par un radical alkyl(C_1-C_6), alkyl(C_1-C_6)carbonyle, amido ou alkyl(C_1-C_6)sulfonyle ; un radical carboxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical carbamylalkyle en C_1-C_6 ; un radical trifluoroalkyle en C_1-C_6 ; un radical trialkyl(C_1-

C₆)silanealkyle en C₁-C₆; un radical sulfonamidoalkyle en C₁-C₆; un radical alkyl(C₁-C₆)carboxyalkyle en C₁-C₆; un radical alkyl(C₁-C₆)sulfinylalkyle en C₁-C₆; un radical alkyl(C₁-C₆)sulfonylalkyle en C₁-C₆; un radical alkyl(C₁-C₆)carbonylalkyle en C₁-C₆; un radical N-alkyl(C₁-C₆)carbamylalkyle en C₁-C₆; un radical N-alkyl(C₁-C₆)sulfonamidoalkyle en C₁-C₆;

• x est 0 ou 1

- lorsque x = 0, le bras de liaison D est rattaché à l'atome d'azote,

- lorsque x = 1, le bras de liaison D est rattaché à l'un des


sommets E, G, J ou L,

• Y est un contre-ion.

Les sommets E, G, J et L forment de préférence un cycle imidazolique.

Parmi les radicaux R₂ de formules (III), on préfère les radicaux dans lesquels x est égal à 0, D est une simple liaison ou une chaîne alkylène pouvant être substituée.

Selon un troisième mode de réalisation, R₂ représente le radical onium Z correspondant à la formule (IV)



dans laquelle :

• D est une simple liaison ou une chaîne alkylène en C₁-C₁₄, linéaire ou ramifiée pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes

choisis parmi un atome d'oxygène, de soufre ou d'azote, et pouvant être substituée par un ou plusieurs radicaux hydroxyle, alcoxy en C_1-C_6 ou amino, et pouvant porter une ou plusieurs fonctions cétone;

5 • les sommets E, G, J, L et M identiques ou différents, représentent un atome de carbone, d'oxygène, de soufre ou d'azote pour former un cycle choisi parmi les cycles pyridiniques, pyrimidiniques, pyraziniques, triaziniques et pyridaziniques ;

• p est un nombre entier compris entre 0 et 3 inclus ;

• m est un nombre entier compris entre 0 et 5 inclus ;

10 • p+m est un nombre entier compris entre 0 et 5 ;

• les radicaux R_{11} , identiques ou différents, représentent un atome d'halogène, un radical hydroxyle, un radical alkyle en C_1-C_6 , un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 , un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 , un radical alcoxy en C_1-C_6 , un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 , un radical amido, un radical carboxyle, un radical alkylcarbonyle en C_1-C_6 , un radical thio, un radical thioalkyle en C_1-C_6 , un radical alkyl(C_1-C_6)thio, un radical amino, un radical amino substitué par un radical alkyl(C_1-C_6), alkyl(C_1-C_6)carbonyle, amido ou alkyl(C_1-C_6)sulfonyle ; un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 ou un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 ; étant entendu que les radicaux R_{11} sont portés par un atome de carbone,

20 • les radicaux R_{12} , identiques ou différents, représentent un radical alkyle en C_1-C_6 , un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 , un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 , un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 , un radical alcoxy(C_1-C_6)alkyle en C_1-C_6 , un radical carbamylalkyle C_1-C_6 , un radical alkyl(C_1-C_6)carboxyalkyle en C_1-C_6 , un radical benzyle ; étant entendu que les radicaux R_{12} sont portés par un azote,

25 • R_{13} représente un radical alkyle en C_1-C_6 ; un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 ; un radical aryle ; un radical benzyle ; un radical aminoalkyle en C_1-C_6 , un radical aminoalkyle en C_1-C_6 dont l'amine est mono- ou di- substituée par un radical alkyl(C_1-C_6), alkyl(C_1-C_6)carbonyle, amido ou alkyl(C_1-C_6)sulfonyle ; un radical carboxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical

30

carbamylalkyle en C_1-C_6 ; un radical trifluoroalkyle en C_1-C_6 ; un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 ; un radical sulfonamidoalkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)carboxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)sulfinylalkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)sulfonylalkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)carbonylalkyle en C_1-C_6 ; un radical N-alkyl(C_1-C_6)carbamylalkyle en C_1-C_6 ; un radical N-alkyl(C_1-C_6)sulfonamidoalkyle en C_1-C_6 ;

• x est 0 ou 1

- lorsque $x = 0$, le bras de liaison D est rattaché à l'atome d'azote,

- lorsque $x = 1$, le bras de liaison D est rattaché à l'un des sommets E, G, J, L ou M,

• Y représente un contre ion.

De préférence, les sommets E, G, J, L et M forment avec l'azote du cycle un cycle pyridinique et pyrimidinique.

Lorsque x est égal à 0 alors R_{11} est de préférence choisi parmi un radical hydroxyle, un radical alkyle en C_1-C_6 , un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 , un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 , un radical alcoxy en C_1-C_6 , un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 , un radical amido, un radical alkylcarbonyl en C_1-C_6 , un radical amino, un radical amino mono- ou di-substitué par un radical alkyl(C_1-C_6), alkyl(C_1-C_6)carbonyl, amido ou alkyl(C_1-C_6)sulfonyl ; un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 ou un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 et R_{12} est choisi parmi un radical alkyle en C_1-C_6 , un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 , un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 , un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 , un radical alcoxy(C_1-C_6)alkyle en C_1-C_6 , un radical carbamylalkyle C_1-C_6 .

Lorsque x est égal à 1, R_{13} est de préférence choisi parmi un radical alkyle en C_1-C_6 ; un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 ; un radical aminoalkyle en C_1-C_6 , un radical aminoalkyle en C_1-C_6 dont l'amine est mono- ou di-substituée par un radical alkyl(C_1-C_6), alkyl(C_1-C_6)carbonyl, un radical amido ou un radical alkyl(C_1-C_6)sulfonyl ; un radical carbamylalkyle en C_1-C_6 ; un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)carbonylalkyle en C_1-C_6 ; un radical N-alkyl(C_1-

5 C₆)carbamylalkyle en C₁-C₆ ; R₁₁ est choisi parmi un radical hydroxyle, un radical alkyle en C₁-C₆, un radical monohydroxyalkyle en C₁-C₆, un radical polyhydroxyalkyle en C₂-C₆, un radical alcoxy en C₁-C₆, un radical trialkyl(C₁-C₆)silanealkyle en C₁-C₆, un radical amido, un radical alkylcarbonyle en C₁-C₆, un radical amino, un radical amino mono- ou di- substitué par un radical alkyl(C₁-C₆), alkyl(C₁-C₆)carbonyle, amido ou alkyl(C₁-C₆)sulfonyle ; et R₁₂ est choisi parmi un radical alkyle en C₁-C₆, un radical monohydroxyalkyle en C₁-C₆, un radical polyhydroxyalkyle en C₂-C₆, un radical trialkyl(C₁-C₆)silanealkyle en C₁-C₆, un radical alcoxy(C₁-C₆)alkyle en C₁-C₆, un radical carbamylalkyle C₁-C₆.

De préférence, R₁₁, R₁₂ et R₁₃ sont des radicaux alkyles pouvant être substitués.

15 Le radical R₂ peut aussi représenter un radical onium de formule

$$-XP(O)(O-)OCH_2CH_2N^+(CH_3)_3$$

où X représente un atome d'oxygène ou un radical NR₁₄, R₁₄ représentant un hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₄ ou un radical hydroxyalkyle.











20 Dans le cadre de l'invention, R₂ peut aussi représenter un radical guanidine de formule $-X-C=NR_{15}-NR_{16}R_{17}$, X représente un atome d'oxygène ou un radical -NR₁₈, R₁₅, R₁₆, R₁₇ et R₁₈ représentant un hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₄ ou un radical hydroxyalkyle. Selon un mode de réalisation particulier, X est -NR₁₈, R₁₅ est un hydrogène, R₁₆ et R₁₇ sont choisis parmi l'hydrogène ou un radical alkyle, de préférence méthyle.

25 Le pK_a du radical guanidine R₂ est en général tel que ce substituant est présent sous forme cationique (=NR₈H⁺) dans les conditions classiques de teinture des cheveux par oxydation.











30 Dans le cadre de l'invention, le contre ion peut être issu d'un atome d'halogène tel que le brome, le chlore, le fluor ou l'iode, d'un hydroxyde, d'un citrate, d'un succinate, d'un tartrate, d'un lactate, d'un tosylate, d'un mésylate, d'un benzenesulfonate, d'un acétate, d'un hydrogènesulfate ou d'un alkylsulfate en C₁-C₆ tel que par exemple le méthylsulfate, ou l'éthylsulfate.











- 5 Dans le cadre de la présente demande, on utilise de manière préférée les paraphénylènediamines tertiaires cationiques contenant un noyau pyrrolidinique décrites ci-dessus et pour lesquelles R_2 est de formule II ou III. De manière encore plus préférée on utilise les paraphénylènediamines tertiaires cationiques contenant un noyau pyrrolidinique décrites ci-dessus pour lesquelles R_2 est de formule II ou de formule III, avec $x=0$ et pour lesquelles $n=0$.













A titre d'exemples de dérivés de formule (I), on peut citer :

Formule	Nomenclature	formule	Nomenclature
	[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-triméthyl-ammonium; chlorure (1)		[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-diméthyl-tétradécyl-ammonium; bromure (2)
	N'-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-N,N-diméthyl-guanidine (3)		N-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-guanidine (4)
	3-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-méthyl-3H-imidazol-1-ium; chlorure (5)		[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-(2-hydroxy-ethyl)-diméthyl-ammonium; chlorure (6)
	[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-diméthyl-(3-triméthylsilanyl-propyl)-ammonium; chlorure (7)		[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-(-triméthylammonium-hexyl)-diméthyl-ammonium; dichlorure (8)
	[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-oxophosphorylcholine (9)		{2-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yloxy]-ethyl}-triméthyl-ammonium; chlorure (10)

	1-{2-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yloxy]-ethyl}-1-méthyl-pyrrolidinium; chlorure (11)		3-{3-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yloxy]-propyl}-1-méthyl-3H-imidazol-1-ium ; chlorure (12)
	1-{2-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yloxy]-ethyl}-1-méthyl-piperidinium; chlorure (13)		3-{3-[1-(5-triméthylsilanylethyl-4-Amino-3-triméthylsilanylethyl-phényl)-pyrrolidin-3-yloxy]-propyl}-1-méthyl-3H-imidazol-1-um ; chlorure (14)
	[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-triméthyl-ammonium; chlorure (15)		[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-diméthyl-tetradécyl-ammonium; chlorure (16)
	N'-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-N,N-diméthyl-guanidine (17)		N-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-guanidine (18)
	3-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-méthyl-3H-imidazol-1-ium; chlorure (19)		[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-(2-hydroxy-ethyl)-diméthyl-ammonium chlorure (20)

	[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-diméthyl-(3-triméthylsilanyl-propyl) ammonium ; chlorure (21)		[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-(-triméthylammonium-hexyl)-diméthyl-ammonium dichlorure (22)
	[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-oxophosphorylcholine (23)		{2-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yloxy]-ethyl}-triméthyl-ammonium; chlorure (24)
	1-{2-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yloxy]-ethyl}-1-méthyl-pyrrolidinium ; chlorure (25)		3-{3-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yloxy]-propyl}-1-méthyl-3H-imidazol-1-um ; chlorure (26)
	1-{2-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yloxy]-ethyl}-1-méthyl-piperidinium; chlorure (27)		[1-(4-Amino-3-triméthylsilanylethyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-triméthyl-ammonium; chlorure (28)
	3-[1-(4-Amino-3-triméthylsilanylethyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-méthyl-3H-imidazol-1-ium; chlorure (29)		3-{3-[1-(4-Amino-3-triméthylsilanylethyl-phényl)-pyrrolidin-3-yloxy]-propyl}-1-méthyl-3H-imidazol-1-um ; chlorure (30)

	[1-(5-triméthylsilanylethyl-4-Amino-3-triméthylsilanylethyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-triméthyl-ammonium; chlorure (31)		3-[1-(5-triméthylsilanylethyl-4-Amino-3-triméthylsilanylethyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-méthyl-3H-imidazol-1-ium; chlorure (32)
	1'-(4-Amino-phényl)-1-méthyl-[1,3']bipyrrolidinyl-1-ium; chlorure (33)		1'-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-1-méthyl-[1,3']bipyrrolidinyl-1-ium; chlorure (34)
	3-[[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]carbamoyl]-méthyl}-1-méthyl-3H-imidazol-1-ium ; chlorure (35)		3-[[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]carbamoyl]-méthyl}-1-méthyl-3H-imidazol-1-ium ; chlorure (36)
	3-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-(3-triméthylsilanyl-propyl)-3H-imidazol-1-ium ; chlorure (37)		3-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-(3-triméthylsilanyl-propyl)-3H-imidazol-1-ium ; chlorure (38)
	[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-éthyldiméthyl-ammonium ; chlorure (39)		[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-éthyldiméthyl-ammonium; iodure (40)

	[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-propyldiméthyl-ammonium ; iodure, (41)		[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-propyldiméthyl-ammonium ; bromure (42)
	[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-propyldiméthyl-ammonium ; méthosulfate (43)		[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-butyldiméthyl-ammonium ; iodure (44)
	[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-pentyldiméthyl-ammonium ; iodure (45)		[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hexyldiméthyl-ammonium ; iodure (46)
	[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-heptyldiméthyl-ammonium ; iodure (47)		[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-octyldiméthyl-ammonium ; iodure (48)
	[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-décyldiméthyl-ammonium ; iodure (49)		[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hexadécyldiméthyl-ammonium ; iodure (50)
	[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hydroxyéthyldiméthyl-ammonium ; chlorure (51)		[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hydroxyéthyldiméthyl-ammonium ; iodure (52)

Les dérivés de formule I utilisés de manière préférée sont les :

[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-triméthyl-ammonium; chlorure ;

[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-diméthyl-tétradécyl-ammonium; bromure ;

5 N'-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-N,N-diméthyl-guanidine

N-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-guanidine

3-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-méthyl-3H-imidazol-1-ium; chlorure ;

[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-(2-hydroxy-ethyl)-

10 diméthyl-ammonium; chlorure

[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-diméthyl-(3-

triméthylsilanyl-propyl)-ammonium ; chlorure ;

[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-triméthyl-ammonium; chlorure

15 [1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-diméthyl-tétradécyl-ammonium; chlorure

N'-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-N,N-diméthyl-guanidine

N-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-guanidine

20 3-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-méthyl-3H-imidazol-1-ium; chlorure

[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-(2-hydroxy-ethyl)-diméthyl-ammonium chlorure

[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-diméthyl-(3-

25 triméthylsilanyl-propyl ammonium ; chlorure

1'-(4-Amino-phényl)-1-méthyl-[1,3']bipyrrolidinyl-1-ium; chlorure

1'-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-1-méthyl-[1,3']bipyrrolidinyl-1-ium; chlorure

30 3-{[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-ylcarbamoyl]-méthyl}-1-méthyl-3H-imidazol-1-ium ; chlorure

3-{[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-ylcarbamoyl]-méthyl}-1-méthyl-3H-imidazol-1-ium ; chlorure

3-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-(3-triméthylsilanyl-propyl)-3H-imidazol-1-ium ; chlorure

3-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-(3-triméthylsilanyl-propyl)-3H-imidazol-1-ium ; chlorure

5 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-éthyl-diméthyl-ammonium ; chlorure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-éthyl-diméthyl-ammonium ; iodure

10 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-propyl-diméthyl-ammonium ; iodure,

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-propyl-diméthyl-ammonium ; bromure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-propyl-diméthyl-ammonium ; méthosulfate

15 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-butyl-diméthyl-ammonium ; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-pentyl-diméthyl-ammonium ; iodure

20 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hexyl-diméthyl-ammonium ; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-heptyl-diméthyl-ammonium ; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-octyl-diméthyl-ammonium ; iodure

25 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-décyl-diméthyl-ammonium ; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hexadécyl-diméthyl-ammonium ; iodure

30 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hydroxyéthyl-diméthyl-ammonium ; chlorure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hydroxyéthyl-diméthyl-ammonium ; iodure.

Plus préférablement on utilisera les composés :

[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-triméthyl-ammonium;
chlorure

5 [1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-diméthyl-tetradécyl-
ammonium; bromure

N'-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-N,N-diméthyl-
guanidine

N-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-guanidine

10 3-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-méthyl-3H-imidazol-
1-ium; chlorure

[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-(2-hydroxy-ethyl)-
diméthyl-ammonium; chlorure

[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-diméthyl-(3-
triméthylsilanyl-propyl)-ammonium ; chlorure

15 [1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-(-triméthylammonium-
hexyl)-diméthyl-ammonium; dichlorure

1'-(4-Amino-phényl)-1-méthyl-[1,3']bipyrrolidinyl-1-ium;
chlorure

20 3-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-(3-triméthylsilanyl-
propyl)-3H-imidazol-1-ium ; chlorure

3-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-(3-
triméthylsilanyl-propyl)-3H-imidazol-1-ium ; chlorure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-éthyldiméthyl-
ammonium ; chlorure

25 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-éthyldiméthyl-
ammonium ; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-propyldiméthyl-
ammonium ; iodure,

30 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-propyldiméthyl-
ammonium ; bromure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-propyldiméthyl-
ammonium ; méthosulfate

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-butyldiméthyl-
ammonium ; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-pentyldiméthyl-ammonium ; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hexyldiméthyl-ammonium ; iodure

5 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-heptyldiméthyl-ammonium ; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-octyldiméthyl-ammonium ; iodure

10 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-décyldiméthyl-ammonium ; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hexadécyldiméthyl-ammonium ; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hydroxyéthyl-diméthyl-ammonium ; chlorure

15 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hydroxyéthyl-diméthyl-ammonium ; iodure

Encore plus préférablement, on utilisera les composés suivants :

20 [1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-triméthyl-ammonium; chlorure

3-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-méthyl-3H-imidazol-1-ium; chlorure

[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-(2-hydroxy-ethyl)-diméthyl-ammonium; chlorure

25 1'-(4-Amino-phényl)-1-méthyl-[1,3']bipyrrolidinyl-1-ium; chlorure, et tout particulièrement les

[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-triméthyl-ammonium; chlorure, et

30 [1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-(2-hydroxy-ethyl)-diméthyl-ammonium; chlorure.

Le contre ion n'est pas critique quant au résultat de l'invention, tout composé similaire aux composés préférés décrits ci-dessus mais avec un contre ion différent, fait partie intégrante des composés préférés.


Le ou les paraphénylènediamines tertiaires cationiques contenant un noyau pyrrolidinique représentent de 0,001% à 10% et de préférence de 0,005 % à 6 % en poids par rapport au poids total de la composition.

5 Les composés de formule (I) peuvent être synthétisés selon des méthodes connues et notamment décrites dans la demande WO02/45675.

10 Les polymères à chaîne grasse, encore appelés "polymères associatifs", possèdent au moins une chaîne hydrocarbonée, saturée ou insaturée, linéaire ou ramifiée en C₈-C₃₀, de préférence C₁₀-C₂₄ et de manière préférée C₁₂-C₁₈.

15 Les polymères à chaîne grasse utilisables dans les compositions selon la présente demande sont choisis parmi les polymères à chaîne grasse (c'est-à-dire associatifs) cationiques tels que les polyuréthanes, les celluloses, ou les dérivés de polyvinylpyrrolidone ou les polymères à chaîne grasse (c'est-à-dire associatifs) anioniques tels que les polymères à motifs esters d'alkyl(C₁₀-C₃₀) d'acide (méth)acrylique ou d'éthers d'allyle à chaîne grasse.

20 A titre de polymères à chaîne grasse cationiques, on peut utiliser les polyuréthanes associatifs cationiques décrits dans la demande de brevet français FR n° 00 09609 de formule (Va)



dans laquelle :

25 R et R', identiques ou différents, représentent un groupement hydrophobe ou un atome d'hydrogène ;

X et X', identiques ou différents, représentent un groupement comportant une fonction amine portant ou non un groupement hydrophobe, ou encore le groupement L" ;

30 L, L' et L", identiques ou différents, représentent un groupement dérivé d'un diisocyanate ;

P et P', identiques ou différents, représentent un groupement comportant une fonction amine portant ou non un groupement hydrophobe ;

Y représente un groupement hydrophile ;

r est un nombre entier compris entre 1 et 100, de préférence entre 1 et 50 et en particulier entre 1 et 25,

5 n, m, et p valent chacun indépendamment des autres entre 0 et 1000 ;

la molécule contenant au moins une fonction amine protonée ou quaternisée et au moins un groupement hydrophobe.

10 Dans un mode de réalisation préféré des polyuréthanes de la présente invention, les seuls groupements hydrophobes sont les groupes R et R' aux extrémités de chaîne.

Une famille préférée de polyuréthanes associatifs cationiques est celle correspondant à la formule (Va) décrite ci-dessus et dans laquelle :

15 R et R' représentent tous les deux indépendamment un groupement hydrophobe,

X, X' représentent chacun un groupe L'',

n et p valent entre 1 et 1000 et

L, L', L'', P, P', Y et m ont la signification indiquée ci-dessus.

20 Une autre famille préférée de polyuréthanes associatifs cationiques est celle correspondant à la formule (Va) ci-dessus dans laquelle :

25 R et R' représentent tous les deux indépendamment un groupement hydrophobe, X, X' représentent chacun un groupe L'', n et p valent 0, et L, L', L'', Y et m ont la signification indiquée ci-dessus.

30 Le fait que n et p valent 0 signifie que ces polymères ne comportent pas de motifs dérivés d'un monomère à fonction amine, incorporé dans le polymère lors de la polycondensation. Les fonctions amine protonées de ces polyuréthanes résultent de l'hydrolyse de fonctions isocyanate, en excès, en bout de chaîne, suivie de l'alkylation des fonctions amine primaire formées par des agents d'alkylation à groupe hydrophobe, c'est-à-dire des composés de type RQ ou R'Q, dans lequel R et R' sont tels que définis plus haut et Q désigne un groupe partant tel qu'un halogénure, un sulfate etc.

Encore une autre famille préférée de polyuréthanes associatifs cationiques est celle correspondant à la formule (Va) ci-dessus dans laquelle :

5 R et R' représentent tous les deux indépendamment un groupement hydrophobe,

X et X' représentent tous les deux indépendamment un groupement comportant une amine quaternaire,

n et p valent zéro, et

L, L', Y et m ont la signification indiquée ci-dessus.


10 La masse moléculaire moyenne en nombre des polyuréthanes associatifs cationiques est comprise de préférence entre 400 et 500 000, en particulier entre 1000 et 400 000 et idéalement entre 1000 et 300 000.

15 Par groupement hydrophobe, on entend un radical ou polymère à chaîne hydrocarbonée, saturée ou non, linéaire ou ramifiée, pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes tels que P, O, N, S, ou un radical à chaîne perfluorée ou siliconée. Lorsqu'il désigne un radical hydrocarboné, le groupement hydrophobe comporte au moins 10 atomes de carbone, de préférence de 10 à 30 atomes de carbone, en
20 particulier de 12 à 30 atomes de carbone et plus préférentiellement de 18 à 30 atomes de carbone.

Préférentiellement, le groupement hydrocarboné provient d'un composé monofonctionnel.

25 A titre d'exemple, le groupement hydrophobe peut être issu d'un alcool gras tel que l'alcool stéarylique, l'alcool dodécylique, l'alcool décylrique. Il peut également désigner un polymère hydrocarboné tel que par exemple le polybutadiène.

30 Lorsque X et/ou X' désignent un groupement comportant une amine tertiaire ou quaternaire, X et/ou X' peuvent représenter l'une des formules suivantes :




dans lesquelles :

5 R_2 représente un radical alkylène ayant de 1 à 20 atomes de carbone, linéaire ou ramifié, comportant ou non un cycle saturé ou insaturé, ou un radical arylène, un ou plusieurs des atomes de carbone pouvant être remplacé par un hétéroatome choisi parmi N, S, O, P ;

10 R_1 et R_3 , identiques ou différents, désignent un radical alkyle ou alcényle en C_1 - C_{30} , linéaire ou ramifié, un radical aryle, l'un au moins des atomes de carbone pouvant être remplacé par un hétéroatome choisi parmi N, S, O, P ;

A^- est un contre-ion physiologiquement acceptable.

Les groupements L, L' et L'' représentent un groupe de formule :




dans laquelle :

Z représente -O-, -S- ou -NH- ; et

20 R_4 représente un radical alkylène ayant de 1 à 20 atomes de carbone, linéaire ou ramifié, comportant ou non un cycle saturé ou insaturé, un radical arylène, un ou plusieurs des atomes de carbone pouvant être remplacé par un hétéroatome choisi parmi N, S, O et P.

Les groupements P et P', comprenant une fonction amine peuvent représenter au moins l'une des formules suivantes :



dans lesquelles :

5 R_5 et R_7 ont les mêmes significations que R_2 défini précédemment;

R_6 , R_8 et R_9 ont les mêmes significations que R_1 et R_3 définis précédemment ;

10 R_{10} représente un groupe alkylène, linéaire ou ramifié, éventuellement insaturé et pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi N, O, S et P,

et A^- est un contre-ion physiologiquement acceptable.

En ce qui concerne la signification de Y, on entend par groupement hydrophile, un groupement hydrosoluble polymérique ou non.

15 A titre d'exemple, on peut citer, lorsqu'il ne s'agit pas de polymères, l'éthylèneglycol, le diéthylèneglycol et le propylèneglycol.

Lorsqu'il s'agit, conformément à un mode de réalisation préféré de l'invention, d'un polymère hydrophile, on peut citer à titre d'exemple les polyéthers, les polyesters sulfonés, les polyamides sulfonés, ou un mélange de ces polymères. A titre préférentiel, le

20


composé hydrophile est un polyéther et notamment un poly(oxyde d'éthylène) ou poly(oxyde de propylène).

Les polyuréthanes associatifs cationiques de formule (Va) selon l'invention sont formés à partir de diisocyanates et de différents composés possédant des fonctions à hydrogène labile. Les fonctions à hydrogène labile peuvent être des fonctions alcool, amine primaire ou secondaire ou thiol donnant, après réaction avec les fonctions diisocyanate, respectivement des polyuréthanes, des polyurées et des polythiourées. Le terme "polyuréthanes" de la présente invention englobe ces trois types de polymères à savoir les polyuréthanes proprement dits, les polyurées et les polythiourées ainsi que des copolymères de ceux-ci.


Un premier type de composés entrant dans la préparation du polyuréthane de formule (Va) est un composé comportant au moins un motif à fonction amine. Ce composé peut être multifonctionnel, mais préférentiellement le composé est difonctionnel, c'est-à-dire que selon un mode de réalisation préférentiel, ce composé comporte deux atomes d'hydrogène labile portés par exemple par une fonction hydroxyle, amine primaire, amine secondaire ou thiol. On peut également utiliser un mélange de composés multifonctionnels et difonctionnels dans lequel le pourcentage de composés multifonctionnels est faible.

Comme indiqué précédemment, ce composé peut comporter plus d'un motif à fonction amine. Il s'agit alors d'un polymère portant une répétition du motif à fonction amine.

Ce type de composés peut être représenté par l'une des formules suivantes :




ou



dans lesquelles Z, P, P', n et p sont tels que définis plus haut.

A titre d'exemple de composé à fonction amine, on peut citer la N-méthyl-diéthanolamine, la N-tert-butyl-diéthanolamine, la N-sulfoéthyl-diéthanolamine.

Le deuxième composé entrant dans la préparation du polyuréthane de formule (Va) est un diisocyanate correspondant à la formule :



5

dans laquelle R_4 est défini plus haut.

A titre d'exemple, on peut citer le méthylènediphényldiisocyanate, le méthylènedicyclohexanediisocyanate, l'isophoronediiisocyanate, le toluènediiisocyanate, le naphthalènediiisocyanate, le butanediisocyanate, l'hexanediisocyanate.

10

Un troisième composé entrant dans la préparation du polyuréthane de formule (Va) est un composé hydrophobe destiné à former les groupes hydrophobes terminaux du polymère de formule (Va).

15

Ce composé est constitué d'un groupe hydrophobe et d'une fonction à hydrogène labile, par exemple une fonction hydroxyle, amine primaire ou secondaire, ou thiol.

A titre d'exemple, ce composé peut être un alcool gras, tel que notamment l'alcool stéarylique, l'alcool dodécylique, l'alcool décylrique. Lorsque ce composé comporte une chaîne polymérique, il peut s'agir par exemple du polybutadiène hydrogéné-hydroxyle.

20

Le groupe hydrophobe du polyuréthane de formule (Va) peut également résulter de la réaction de quaternisation de l'amine tertiaire du composé comportant au moins un motif amine tertiaire. Ainsi, le groupement hydrophobe est introduit par l'agent quaternisant. Cet agent quaternisant est un composé de type RQ ou $\text{R}'\text{Q}$, dans lequel R et R' sont tels que définis plus haut et Q désigne un groupe partant tel qu'un halogénure, un sulfate etc.

25

Le polyuréthane associatif cationique peut en outre comprendre une séquence hydrophile. Cette séquence est apportée par un quatrième type de composé entrant dans la préparation du polymère. Ce composé peut être multifonctionnel. Il est de préférence difonctionnel. On peut également avoir un mélange où le pourcentage en composé multifonctionnel est faible.

30

Les fonctions à hydrogène labile sont des fonctions alcool, amine primaire ou secondaire, ou thiol. Ce composé peut être un polymère terminé aux extrémités des chaînes par l'une de ces fonctions à hydrogène labile.

5 A titre d'exemple, on peut citer, lorsqu'il ne s'agit pas de polymères, l'éthylèneglycol, le diéthylèneglycol et le propylèneglycol.

10 Lorsqu'il s'agit d'un polymère hydrophile, on peut citer à titre d'exemple les polyéthers, les polyesters sulfonés, les polyamides sulfonés, ou un mélange de ces polymères. A titre préférentiel, le composé hydrophile est un polyéther et notamment un poly(oxyde d'éthylène) ou poly(oxyde de propylène).

15 Le groupe hydrophile noté Y dans la formule (Va) est facultatif. En effet, les motifs à fonction amine quaternaire ou protonée peuvent suffire à apporter la solubilité ou l'hydrodispersibilité nécessaire pour ce type de polymère dans une solution aqueuse.

Bien que la présence d'un groupe Y hydrophile soit facultative, on préfère cependant des polyuréthanes associatifs cationiques comportant un tel groupe.



20 Lesdits polyuréthanes associatifs cationiques sont hydrosolubles ou hydrodispersibles.

25 A titre de polymères à chaîne grasse cationiques, on peut également utiliser les celluloses cationiques à chaîne grasse et plus particulièrement les celluloses quaternisées modifiées par des groupements comportant au moins une chaîne grasse, choisis parmi les groupes alkyles, arylalkyles, alkylaryles comportant de 8 à 30 atomes de carbone, ou des mélanges de ceux-ci.

30 On peut indiquer comme exemples d'alkylhydroxyéthyl-celluloses quaternisées à chaînes grasses en C₈-C₃₀, les produits QUATRISOFT LM 200®, QUATRISOFT LM-X 529-18-A®, QUATRISOFT LM-X 529-18B® (alkyle en C₁₂) et QUATRISOFT LM-X 529-8® (alkyle en C₁₈) commercialisés par la société AMERCHOL et les produits CRODACEL QM®, CRODACEL QL® (alkyle en C₁₂) et CRODACEL QS® (alkyle en C₁₈) commercialisés par la société CRODA.

A titre de polymères à chaîne grasse cationiques, on peut encore utiliser les dérivés de polyvinylpyrrolidone (P.V.P) cationiques à chaîne grasse et en particulier des dérivés de P.V.P. cationiques à chaîne grasse comprenant

- 5 1) au moins un monomère de type vinylpyrrolidone cationique à chaîne grasse
2) au moins un monomère de structure (I) ou (II) suivantes :




dans lesquelles :

X désigne un atome d'oxygène ou un radical NR_6 ,

R_1 et R_6 désignent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un radical alkyl linéaire ou ramifié en $\text{C}_1\text{-C}_5$,

15 R_2 désigne un radical alkyle linéaire ou ramifié en $\text{C}_1\text{-C}_4$,

R_3 , R_4 et R_5 désignent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène, un radical alkyle linéaire ou ramifié en $\text{C}_1\text{-C}_{30}$ ou un radical de formule (III) :



20 Y, Y_1 et Y_2 désignent, indépendamment l'un de l'autre, un radical alkylène linéaire ou ramifié en $\text{C}_2\text{-C}_{16}$,

R_7 désigne un atome d'hydrogène, ou un radical alkyle linéaire ou ramifié en $\text{C}_1\text{-C}_4$ ou un radical hydroxyalkyle linéaire ou ramifié en $\text{C}_1\text{-C}_4$,

25 R_8 désigne un atome d'hydrogène ou un radical alkyle linéaire ou ramifié en $\text{C}_1\text{-C}_{30}$,

p, q et r désignent, indépendamment l'un de l'autre, soit la valeur zéro, soit la valeur 1,

m et n désignent, indépendamment l'un de l'autre, un nombre entier allant de 0 à 100,

5 x désigne un nombre entier allant de 1 à 100,
Z désigne un anion d'acide organique ou minéral,
sous réserve que :

- l'un au moins des substituants R_3 , R_4 , R_5 ou R_8 désigne un radical alkyle linéaire ou ramifié en C_9-C_{30} ,

10 - si m ou n est différent de zéro; alors q est égal à 1,
- si m ou n sont égaux à zéro, alors p ou q est égal à 0.

De préférence le contre ion Z^- des monomères de formule (I) est choisi parmi les ions halogénures, les ions phosphates, l'ion méthosulfate, l'ion tosylate.

15 De préférence, R_3 , R_4 et R_5 désignent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un radical alkyle linéaire en C_1-C_{30} .

Plus préférentiellement, le monomère b) est un monomère de formule (I) pour laquelle, encore plus préférentiellement, m et n sont égaux à zéro.

20 Les P.V.P. cationiques à chaîne grasse peuvent également contenir un ou plusieurs monomères supplémentaires cationiques ou non ioniques. Parmi ces derniers, on peut citer des acrylates et méthacrylates d'alkyle en C_1-C_6 .

25 A titre de P.V.P. cationiques à chaîne grasse particulièrement préférées, on peut citer les terpolymères comprenant

a)-un monomère de type pyrrolidone,

b)-un monomère de formule (I) dans laquelle $p=1$, $q=0$, R_3 et R_4 désignent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C_1-C_5 et R_5 désigne un radical alkyle en C_9-C_{24} et

30 c)-un monomère de formule (II) dans laquelle R_3 et R_4 désignent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C_1-C_5 .

Encore plus particulièrement, on utilise les terpolymères comprenant en poids, 40 à 95% de monomère (a), 0,25 à 50% de monomère (b) et 0,1 à 55% de monomère (c).

5 Il s'agit par exemple des terpolymères vinylpyrrolidone / diméthylaminopropylméthacrylamide / tosylate de dodécyldiméthylméthacrylamidopropylammonium, les terpolymères vinylpyrrolidone / diméthylaminopropylméthacrylamide / tosylate de cocoyldiméthylméthacrylamidopropylammonium, les terpolymères vinylpyrrolidone / diméthylaminopropylméthacrylamide / tosylate ou chlorure de
10 lauryldiméthylméthacrylamidopropylammonium.

La masse moléculaire en poids des polyvinyl(pyrrolidone) cationiques est comprise entre 500 et 20 000 000, de préférence comprise entre 200 000 et 2 000 000 et plus préférentiellement comprise entre 400 000 et 800 000.

15 A titre de polyvinylpyrrolidone cationique utilisable selon l'invention, on peut citer le produit ACP 1234 d'ISP.

A titre de polymère à chaîne grasse anionique, on peut utiliser un polymère amphiphile anionique comportant au moins un motif hydrophile choisi parmi les motifs acide acrylique et acide
20 méthacrylique et au moins un motif hydrophobe choisi parmi les motifs de type ester d'alkyle (C_{10} - C_{30}) d'acide acrylique et de type ester d'alkyle (C_{10} - C_{30}) d'acide méthacrylique.

De préférence, le motif hydrophobe du polymère amphiphile anionique est choisi parmi les motifs de type ester d'alkyle (C_{12} - C_{22}) d'acide acrylique et de type ester d'alkyle (C_{12} - C_{22}) d'acide
25 méthacrylique.


Il s'agit notamment d'un polymère d'acide acrylique et de méthacrylate de lauryle.

30 Comme polymère de cette famille, on peut citer les polymères PEMULEN TR1 et TR2 et le CARBOPOL 1382 de GOODRICH, ainsi que le polymère COATEX SX de SEPPIC.

Le passage de la demande EP 0827 738 consacré à ces polymères amphiphiles anioniques et à leur synthèse est incorporé par référence dans la présente demande.

A titre de polymère à chaîne grasse anionique, on peut encore utiliser un polymère à chaîne grasse anionique est un polymère amphiphile anionique comportant au moins un motif hydrophile de type acide acrylique et au moins un motif éther allyl à chaîne grasse.

5 De préférence, le motif éther d'allyl à chaîne grasse correspond au monomère de formule (I) suivante :



10 dans laquelle R' désigne H ou CH₃, B désigne le radical éthylèneoxy, n est nul ou désigne un entier allant de 1 à 100, R désigne un radical hydrocarboné choisi parmi les radicaux alkyl, arylalkyl, aryl, alkylaryl, cycloalkyl, comprenant de 8 à 30 atomes de carbone, de préférence 10 à 24 et plus particulièrement 12 à 18 atomes de carbone.

15 Ces polymères amphiphiles anioniques peuvent être préparés par un procédé de polymérisation en émulsion décrit dans le brevet EP 0 216 479 B2.

20 Un motif de formule (I) plus particulièrement préféré est un motif dans lequel R' désigne H, n est égal à 10 et R désigne un radical stéaryl (C₁₈).

25 Parmi ces polymères amphiphiles anioniques, on utilise particulièrement les polymères formés à partir de 20 à 60% en poids d'acide acrylique, de 5 à 60% en poids de meth(acrylate)d'alkyl inférieur (C₁-C₆), de 2 à 50% en poids d'éther allyl à chaîne grasse de formule (I) et 0 à 1% en poids d'un agent réticulant qui est un monomère insaturé polyéthylénique copolymérisable bien connu comme le phtalate de diallyl, le méthacrylate d'allyl, le divinyl benzène, le diméthacrylate de polyéthylène glycol et le méthylène bis-

30 acrylamide.

Dans les compositions selon la présente invention, le polymère à chaîne grasse représente de 0,05% à 20%, de préférence de 0,1% à 10% et de manière préférée de 0,5% à 5% en poids par rapport au poids total de la composition.

Selon un premier mode préféré, la composition selon la présente invention contient en outre au moins un polymère cationique additionnel.

5 Au sens de la présente invention, l'expression "polymère cationique" additionnel désigne tout polymère contenant des groupements cationiques et/ou des groupements ionisables en groupements cationiques autres que les polymères à chaîne grasse cationiques utiles dans les compositions selon la présente demande.

10 Les polymères cationiques utilisables conformément à la présente invention peuvent être choisis parmi tous ceux déjà connus en soi comme améliorant les propriétés cosmétiques des cheveux, à savoir notamment ceux décrits dans la demande de brevet EP-A-337 354 et dans les brevets français FR-2 270 846, 2 383 660, 2 598 611, 2 470 596 et 2 519 863.





15 Les polymères cationiques additionnels préférés sont choisis parmi ceux qui contiennent des motifs comportant des groupements amine primaire, secondaire, tertiaire et/ou quaternaire pouvant, soit faire partie de la chaîne principale polymère, soit être portés par un substituant latéral directement relié à celle-ci.

20 Les polymères cationiques additionnels utilisés ont généralement une masse moléculaire moyenne en nombre comprise entre 500 et $5 \cdot 10^6$ environ, et de préférence comprise entre 10^3 et $3 \cdot 10^6$ environ.

25 Parmi les polymères cationiques additionnels, on peut citer plus particulièrement les polymères du type polyamine, polyaminoamide et polyammonium quaternaire.

 Ce sont des produits connus. Ils sont notamment décrits dans les brevets français n° 2 505 348 ou 2 542 997. Parmi lesdits polymères, on peut citer :

30 (1) Les homopolymères ou copolymères dérivés d'esters ou d'amides acryliques ou méthacryliques et comportant au moins un des motifs de formules (VI), (VII), (VIII) ou (IX) suivantes :

X⁻X⁻

(IX)

dans lesquelles:

R₃ désigne un atome d'hydrogène ou un radical CH₃ ;

5 A représente un groupe alkyle, linéaire ou ramifié, comprenant de 1 à 6 atomes de carbone, de préférence 2 ou 3 atomes de carbone ou un groupe hydroxyalkyle comprenant de 1 à 4 atomes de carbone ;

R₄, R₅, R₆, identiques ou différents, représentent un groupe alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone ;

10 R₁ et R₂ , identiques ou différents, représentent hydrogène ou un groupe alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone et de préférence méthyle ou éthyle;

X⁻ désigne un anion dérivé d'un acide minéral ou organique tel qu'un anion méthosulfate ou un halogénure tel que chlorure ou bromure.

Les polymères de la famille (1) peuvent contenir en outre un ou plusieurs motifs dérivant de comonomères pouvant être choisis dans la famille des acrylamides, méthacrylamides, diacétones acrylamides, acrylamides et méthacrylamides substitués sur l'azote par des alkyles inférieurs (C₁-C₄), des acides acryliques ou méthacryliques ou leurs esters, des vinylactames tels que la vinylpyrrolidone ou le vinylcaprolactame, des esters vinyliques.

Ainsi, parmi ces polymères de la famille (1), on peut citer :

- les copolymères d'acrylamide et de diméthylaminoéthyl méthacrylate quaternisé au sulfate de diméthyle ou avec un hlogénure de diméthyle, tel que celui vendu sous la dénomination HERCOFLOC par la société HERCULES,

- les copolymères d'acrylamide et de chlorure de méthacryloyloxyéthyltriméthylammonium décrits par exemple dans la demande de brevet EP-A-080976 et vendus sous la dénomination BINA QUAT P 100 par la société CIBA GEIGY,

- le copolymère d'acrylamide et de méthosulfate de méthacryloyloxyéthyltriméthylammonium vendu sous la dénomination RETEN par la société HERCULES,

- les copolymères vinylpyrrolidone / acrylate ou méthacrylate de dialkylaminoalkyle quaternisés ou non, tels que les produits vendus sous la dénomination "GAFQUAT" par la société ISP comme par exemple "GAFQUAT 734" ou "GAFQUAT 755" ou bien les produits dénommés "COPOLYMER 845, 958 et 937". Ces polymères sont décrits en détail dans les brevets français 2.077.143 et 2.393.573,

- les terpolymères méthacrylate de diméthyl amino éthyle/ vinylcaprolactame/ vinylpyrrolidone tel que le produit vendu sous la dénomination GAFFIX VC 713 par la société ISP,

- les copolymères vinylpyrrolidone / méthacrylamidopropyl diméthylamine commercialisés notamment sous la dénomination STYLEZE CC 10 par ISP;

- et les copolymères vinylpyrrolidone / méthacrylamide de diméthylaminopropyle quaternisés tel que le produit vendu sous la dénomination "GAFQUAT HS 100" par la société ISP .

5 (2) Les dérivés d'éthers de cellulose comportant des groupements ammonium quaternaire décrits dans le brevet français 1 492 597, et en particulier les polymères commercialisés sous les dénominations "JR" (JR 400, JR 125, JR 30M) ou "LR" (LR 400, LR 30M) par la Société Union Carbide Corporation. Ces polymères sont également définis dans le dictionnaire CTFA comme des ammonium
10 quaternaires d'hydroxyéthylcellulose ayant réagi avec un époxyde substitué par un groupement triméthylammonium .

(3) Les dérivés de cellulose cationiques tels que les
15 copolymères de cellulose ou les dérivés de cellulose greffés avec un monomère hydrosoluble d'ammonium quaternaire, et décrits notamment dans le brevet US 4 131 576, tels que les hydroxyalkyl celluloses, comme les hydroxyméthyl-, hydroxyéthyl- ou hydroxypropyl celluloses greffées notamment avec un sel de méthacryloyléthyl triméthylammonium, de méthacrylamidopropyl triméthylammonium, de
20 diméthyl-diallylammonium.

20 Les produits commercialisés répondant à cette définition sont plus particulièrement les produits vendus sous la dénomination "Celquat L 200" et "Celquat H 100" par la Société National Starch.

(4) Les polysaccharides cationiques décrits plus
25 particulièrement dans les brevets US 3 589 578 et 4 031 307 tel que les gommes de guar contenant des groupements cationiques trialkylammonium. On utilise par exemple des gommes de guar modifiées par un sel (par ex. chlorure) de 2,3-époxypropyl triméthylammonium.

30 De tels produits sont commercialisés notamment sous les dénominations commerciales de JAGUAR C13 S, JAGUAR C 15, JAGUAR C 17 ou JAGUAR C162 par la société MEYHALL.

(5) Les polymères constitués de motifs pipérazinyle et de radicaux divalents alkylène ou hydroxyalkylène à chaînes droites ou ramifiées, éventuellement interrompues par des atomes d'oxygène, de

soufre, d'azote ou par des cycles aromatiques ou hétérocycliques, ainsi que les produits d'oxydation et/ou de quaternisation de ces polymères. De tels polymères sont notamment décrits dans les brevets français 2.162.025 et 2.280.361.

5 (6) Les polyaminoamides solubles dans l'eau préparés en particulier par polycondensation d'un composé acide avec une polyamine ; ces polyaminoamides peuvent être réticulés par une épihalohydrine, un diépoxyde, un dianhydride, un dianhydride non saturé, un dérivé bis-insaturé, une bis-halohydrine, un bis-azétidinium, 10 une bis-haloacyldiamine, un bis-halogénure d'alkyle ou encore par un oligomère résultant de la réaction d'un composé bifonctionnel réactif vis-à-vis d'une bis-halohydrine, d'un bis-azétidinium, d'une bis-haloacyldiamine, d'un bis-halogénure d'alkyle, d'une épilhalohydrine, d'un diépoxyde ou d'un dérivé bis-insaturé ; l'agent réticulant étant 15 utilisé dans des proportions allant de 0,025 à 0,35 mole par groupement amine du polyaminoamide ; ces polyaminoamides peuvent être alcoylés ou s'ils comportent une ou plusieurs fonctions amines tertiaires, quaternisées. De tels polymères sont notamment décrits dans les brevets français 2.252.840 et 2.368.508.

20 (7) Les dérivés de polyaminoamides résultant de la condensation de polyalcoylènes polyamines avec des acides polycarboxyliques suivie d'une alcoylation par des agents bifonctionnels. On peut citer par exemple les polymères acide adipique-diacoylaminohydroxyalcoyldialoylène triamine dans lesquels le radical 25 alcoyle comporte de 1 à 4 atomes de carbone et désigne de préférence méthyle, éthyle, propyle. De tels polymères sont notamment décrits dans le brevet français 1.583.363.



Parmi ces dérivés, on peut citer plus particulièrement les polymères acide adipique/diméthylaminohydroxypropyl/diéthylène 30 triamine vendus sous la dénomination "Cartaretine F, F4 ou F8" par la société Sandoz.

(8) Les polymères obtenus par réaction d'une polyalkylène polyamine comportant deux groupements amine primaire et au moins un groupement amine secondaire avec un acide dicarboxylique choisi parmi

l'acide diglycolique et les acides dicarboxyliques aliphatiques saturés ayant de 3 à 8 atomes de carbone. Le rapport molaire entre le polyalkylène polylamine et l'acide dicarboxylique étant compris entre 0,8 : 1 et 1,4 : 1; le polyaminoamide en résultant étant amené à réagir avec l'épichlorhydrine dans un rapport molaire d'épichlorhydrine par rapport au groupement amine secondaire du polyaminoamide compris entre 0,5 : 1 et 1,8 : 1. De tels polymères sont notamment décrits dans les brevets américains 3.227.615 et 2.961.347.

Des polymères de ce type sont en particulier commercialisés sous la dénomination "Hercosett 57" par la société Hercules Inc. ou bien sous la dénomination de "PD 170" ou "Delsette 101" par la société Hercules dans le cas du copolymère d'acide adipique/époxypropyl/diéthylènetriamine.


(9) Les cyclopolymères d'alkyl diallyl amine ou de dialkyl diallyl ammonium tels que les homopolymères ou copolymères comportant comme constituant principal de la chaîne des motifs répondant aux formules (X) ou (XI) :



formules dans lesquelles k et t sont égaux à 0 ou 1, la somme k + t étant égale à 1 ; R₉ désigne un atome d'hydrogène ou un radical méthyle ; R₇ et R₈, indépendamment l'un de l'autre, désignent un groupement alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone, un groupement hydroxyalkyle dans lequel le groupement alkyle a de préférence 1 à 5 atomes de carbone, un groupement amidoalkyle inférieur (C₁-C₄), ou R₇ et R₈ peuvent désigner conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont rattachés, des groupement hétérocycliques, tels que pipéridinyle ou morpholinyle ; R₇ et R₈ indépendamment l'un de l'autre désignent de préférence un groupement alkyle ayant de 1 à 4 atomes de carbone ; Y- est un anion tel que bromure, chlorure, acétate, borate, citrate, tartrate, bisulfate, bisulfite, sulfate, phosphate. Ces polymères sont notamment décrits dans le brevet français 2.080.759 et dans son certificat d'addition 2.190.406.

Parmi les polymères définis ci-dessus, on peut citer plus particulièrement l'homopolymère de chlorure de diméthyldiallylammonium vendu sous la dénomination "Merquat 100" par la société Calgon (et ses homologues de faible masse moléculaire moyenne en poids) et les copolymères de chlorure de diallyldiméthylammonium et d'acrylamide commercialisés sous la dénomination "MERQUAT 550".

(10) Le polymère de diammonium quaternaire contenant des motifs récurrents répondant à la formule :



formule (XII) dans laquelle :

R₁₀, R₁₁, R₁₂ et R₁₃, identiques ou différents, représentent des radicaux aliphatiques, alicycliques, ou arylaliphatiques contenant de 1 à 6 atomes de carbone ou des radicaux hydroxyalkylaliphatiques



inférieurs, ou bien R_{10} , R_{11} , R_{12} et R_{13} , ensemble ou séparément, constituent avec les atomes d'azote auxquels ils sont rattachés des hétérocycles contenant éventuellement un second hétéroatome autre que l'azote ou bien R_{10} , R_{11} , R_{12} et R_{13} représentent un radical alkyle en C_1 - C_6 linéaire ou ramifié substitué par un groupement nitrile, ester, acyle, amide ou $-CO-O-R_{14}-D$ ou $-CO-NH-R_{14}-D$ où R_{14} est un alkylène et D un groupement ammonium quaternaire ;

A_1 et B_1 représentent des groupements polyméthyléniques contenant de 2 à 20 atomes de carbone pouvant être linéaires ou ramifiés, saturés ou insaturés, et pouvant contenir, liés à ou intercalés dans la chaîne principale, un ou plusieurs cycles aromatiques, ou un ou plusieurs atomes d'oxygène, de soufre ou des groupements sulfoxyde, sulfone, disulfure, amino, alkylamino, hydroxyle, ammonium quaternaire, uréido, amide ou ester, et

X^- désigne un anion dérivé d'un acide minéral ou organique ;

A_1 , R_{10} et R_{12} peuvent former avec les deux atomes d'azote auxquels ils sont rattachés un cycle pipérazinique ; en outre si A_1 désigne un radical alkylène ou hydroxyalkylène linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé, B_1 peut également désigner un groupement $-(CH_2)_n-CO-D-OC-(CH_2)_n-$ dans lequel D désigne :


a) un reste de glycol de formule : $-O-Z-O-$, où Z désigne un radical hydrocarboné linéaire ou ramifié ou un groupement répondant à l'une des formules suivantes :



où x et y désignent un nombre entier de 1 à 4, représentant un degré de polymérisation défini et unique ou un nombre quelconque de 1 à 4 représentant un degré de polymérisation moyen ;

b) un reste de diamine bis-secondaire tel qu'un dérivé de pipérazine ;

c) un reste de diamine bis-primaire de formule : $-NH-Y-NH-$, où Y désigne un radical hydrocarboné linéaire ou ramifié, ou bien le radical bivalent




d) un groupement uréylène de formule : $-\text{NH}-\text{CO}-\text{NH}-$.

De préférence, X^- est un anion tel que le chlorure ou le bromure.

Ces polymères ont une masse moléculaire moyenne en nombre généralement comprise entre 1000 et 100000.

5 Des polymères de ce type sont notamment décrits dans les brevets français 2.320.330, 2.270.846, 2.316.271, 2.336.434 et 2.413.907 et les brevets US 2.273.780, 2.375.853, 2.388.614, 2.454.547, 3.206.462, 2.261.002, 2.271.378, 3.874.870, 4.001.432, 3.929.990, 3.966.904, 4.005.193, 4.025.617, 4.025.627, 4.025.653, 4.026.945 et 10 4.027.020.

On peut utiliser plus particulièrement les polymères qui sont constitués de motifs récurrents répondant à la formule (XIII) suivante:




15

dans laquelle R_{10} , R_{11} , R_{12} et R_{13} , identiques ou différents, désignent un radical alkyle ou hydroxyalkyle ayant de 1 à 4 atomes de carbone environ, n et p sont des nombres entiers variant de 2 à 20 environ et, X^- est un anion dérivé d'un acide minéral ou organique.

20

(11) Les polymères de polyammonium quaternaire constitués de motifs récurrents de formule (XIV) :



dans laquelle p désigne un nombre entier variant de 1 à 6 environ, D peut être nul ou peut représenter un groupement $-(CH_2)_r-CO-$ dans lequel r désigne un nombre égal à 4 ou à 7, X- est un anion ;

5 De tels polymères peuvent être préparés selon les procédés décrits dans les brevets U.S.A. n° 4 157 388, 4 702 906, 4 719 282. Ils sont notamment décrits dans la demande de brevet EP-A-122 324.

Parmi eux, on peut par exemple citer, les produits "Mirapol A 15", "Mirapol AD1", "Mirapol AZ1" et "Mirapol 175" vendus par la société Miranol.

10 (12) Les polymères quaternaires de vinylpyrrolidone et de vinylimidazole tels que par exemple les produits commercialisés sous les dénominations Luviquat FC 905, FC 550 et FC 370 par la société B.A.S.F.


15 (13) Les polyamines comme le Polyquart H vendu par HENKEL, référencé sous le nom de "POLYETHYLENEGLYCOL (15) TALLOW POLYAMINE" dans le dictionnaire CTFA.

20 (14) Les polymères réticulés de sels de méthacryloyloxyalkyl(C1-C4) trialkyl(C1-C4)ammonium tels que les polymères obtenus par homopolymérisation du diméthylaminoéthyl-méthacrylate quaternisé par le chlorure de méthyle, ou par copolymérisation de l'acrylamide avec le diméthylaminoéthyl-méthacrylate quaternisé par le chlorure de méthyle, l'homo ou la copolymérisation étant suivie d'une réticulation par un composé à insaturation oléfinique, en particulier le méthylène bis acrylamide. On
25 peut plus particulièrement utiliser un copolymère réticulé acrylamide/chlorure de méthacryloyloxyéthyl triméthylammonium (20/80 en poids) sous forme de dispersion contenant 50 % en poids dudit copolymère dans de l'huile minérale. Cette dispersion est commercialisée sous le nom de "SALCARE® SC 92" par la Société
30 ALLIED COLLOIDS. On peut également utiliser un homopolymère réticulé du chlorure de méthacryloyloxyéthyl triméthylammonium contenant environ 50 % en poids de l'homopolymère dans de l'huile minérale ou dans un ester liquide. Ces dispersions sont commercialisées


sous les noms de "SALCARE® SC 95" et "SALCARE® SC 96" par la Société ALLIED COLLOIDS.

5 D'autres polymères cationiques utilisables dans le cadre de l'invention sont des polyalkylèneimines, en particulier des polyéthylèneimines, des polymères contenant des motifs vinylpyridine ou vinylpyridinium, des condensats de polyamines et d'épichlorhydrine, des polyuréylènes quaternaires et les dérivés de la chitine.

10 Parmi tous les polymères cationiques susceptibles d'être utilisés dans le cadre de la présente invention, on préfère mettre en oeuvre les polymères des familles (1), (9), (10) (11) et (14) et encore plus préférentiellement les polymères aux motifs récurrents de formules (W) et (U) suivantes :



15 et notamment ceux dont le poids moléculaire, déterminé par chromatographie par perméation de gel, est compris entre 9500 et 9900 ;



20 et notamment ceux dont le poids moléculaire, déterminé par chromatographie par perméation de gel, est d'environ 1200.

La concentration en polymère cationique additionnel dans la composition selon la présente invention peut varier de 0,01 à 10% en poids par rapport au poids total de la composition, de préférence de 0,05 à 5% et plus préférentiellement encore de 0,1 à 3%.

25 Selon un deuxième mode préféré, la composition selon la présente invention contient en outre au moins un polymère épaississant

encore appelé " agents d'ajustement de la rhéologie" autre que les polymères à chaîne grasse de l'invention.

5 Les agents d'ajustement de la rhéologie additionnels peuvent être choisis parmi les amides d'acides gras (diéthanol- ou monoéthanol-amide de coprah, monoéthanolamide d'acide alkyl éther carboxylique oxyéthyléné), les épaississants cellulose (hydroxyéthylcellulose, hydroxypropylcellulose, carboxyméthylcellulose.), la gomme de guar et ses dérivés (hydroxypropylguar.), les gommes d'origine microbienne (gomme de xanthane, gomme de scléroglycane.), les homopolymères
10 réticulés d'acide acrylique ou d'acide acrylamidopropanesulfonique et les polymères associatifs additionnels tels que décrits ci-dessous.

15 Les polymères associatifs additionnels utilisables selon l'invention sont des polymères hydrosolubles capables, dans un milieu aqueux, de s'associer réversiblement entre eux ou avec d'autres molécules. Ces polymères sont différents des polymères à chaîne grasse utiles dans les compositions selon la présente demande.

Leur structure chimique comprend des zones hydrophiles, et des zones hydrophobes caractérisées par au moins une chaîne grasse.

20 Les polymères associatifs additionnels utilisables selon l'invention peuvent être de type anionique, cationique, amphotère et de préférence non ionique.

25 Leur concentration en poids dans la composition colorante peut varier d'environ 0,01 à 10% du poids total de la composition et dans la composition prête à l'emploi (comprenant l'oxydant) d'environ 0,0025 à 10% du poids total de la composition. Plus préférentiellement, cette quantité varie d'environ 0,1 à 5% en poids dans la composition colorante et d'environ 0,025 à 10% dans la composition prête à l'emploi.

Parmi les polymères associatifs de type anionique, on peut citer :

30 -(I) les terpolymères d'anhydride maléique/ α -oléfine en C₃₀-C₃₈/ maléate d'alkyle tel que le produit (copolymère anhydride maléique/ α -oléfine en C₃₀-C₃₈/maléate d'isopropyle) vendu sous le nom PERFORMA V 1608® par la société NEWPHASE TECHNOLOGIES.

-(II) les terpolymères acryliques comprenant :

(a) environ 20% à 70% en poids d'un acide carboxylique à insaturation α,β -monoéthylénique,

(b) environ 20 à 80% en poids d'un monomère à insaturation α,β -monoéthylénique non-tensio-actif différent de (a),

5 (c) environ 0,5 à 60% en poids d'un mono-uréthane non-ionique qui est le produit de réaction d'un tensio-actif monohydrique avec un monoisocyanate à insaturation monoéthylénique,

tels que ceux décrits dans la demande de brevet EP-A-0173109 et plus particulièrement celui décrit dans l'exemple 3, à savoir, un
10 terpolymère acide méthacrylique /acrylate de méthyle/diméthyl métaisopropényle benzyl isocyanate d'alcool béhényle éthoxylé (40OE) en dispersion aqueuse à 25%.

15 -(III) les copolymères comportant parmi leurs monomères un acide carboxylique à insaturation α,β -monoéthylénique et un ester d'acide carboxylique à insaturation α,β -monoéthylénique et d'un alcool gras oxyalkyléné.

Préférentiellement ces composés comprennent également comme monomère un ester d'acide carboxylique à insaturation α,β -monoéthylénique et d'alcool en C_1 - C_4 .

20 A titre d'exemple de ce type de composé on peut citer l'ACULYN 22® vendu par la société ROHM et HAAS, qui est un terpolymère acide méthacrylique/acrylate d'éthyle/méthacrylate de stéaryle oxyalkyléné.

25 Parmi les polymères associatifs additionnels de type cationique, on peut citer les polyacrylates à groupements latéraux aminés non cycliques.

Les polymères associatifs de type non ionique additionnels utilisables selon l'invention sont choisis de préférence parmi :

-(1) les celluloses modifiées par des groupements comportant au moins une chaîne grasse ;

30 on peut citer à titre d'exemple :

- les hydroxyéthylcelluloses modifiées par des groupements comportant au moins une chaîne grasse tels que des groupes alkyle, arylalkyle, alkylaryle, ou leurs mélanges, et dans lesquels les groupes alkyle sont de préférence en C_8 - C_{22} , comme le produit NATROSOL

PLUS GRADE 330 CS® (alkyles en C₁₆) vendu par la société AQUALON, ou le produit BERMOCOLL EHM 100® vendu par la société BEROL NOBEL,

5 - celles modifiées par des groupes polyalkylène glycol éther d'alkyl phénol, tel que le produit AMERCELL POLYMER HM-1500® (polyéthylène glycol (15) éther de nonyl phénol) vendu par la société AMERCHOL.

10 -(2) les hydroxypropylguars modifiés par des groupements comportant au moins une chaîne grasse tel que le produit ESAFLOR HM 22® (chaîne alkyle en C₂₂) vendu par la société LAMBERTI, les produits RE210-18® (chaîne alkyle en C₁₄) et RE205-1® (chaîne alkyle en C₂₀) vendus par la société RHONE POULENC.

15 -(3) les copolymères de vinyl pyrrolidone et de monomères hydrophobes à chaîne grasse dont on peut citer à titre d'exemple :

- les produits ANTARON V216® ou GANEX V216® (copolymère vinylpyrrolidone / hexadécène) vendu par la société I.S.P.

- les produits ANTARON V220® ou GANEX V220® (copolymère vinylpyrrolidone / eicosène) vendu par la société I.S.P.

20 -(4) les copolymères de méthacrylates ou d'acrylates d'alkyles en C₁-C₆ et de monomères amphiphiles comportant au moins une chaîne grasse tels que par exemple le copolymère acrylate de méthyle/acrylate de stéaryle oxyéthyléné vendu par la société GOLDSCHMIDT sous la dénomination ANTIL 208®.

25 -(5) les copolymères de méthacrylates ou d'acrylates hydrophiles et de monomères hydrophobes comportant au moins une chaîne grasse tels que par exemple le copolymère méthacrylate de polyéthylèneglycol/méthacrylate de lauryle.

30 -(6) les polyuréthanes polyéthers comportant dans leur chaîne, à la fois des séquences hydrophiles de nature le plus souvent polyoxyéthylénée et des séquences hydrophobes qui peuvent être des enchaînements aliphatiques seuls et/ou des enchaînements cycloaliphatiques et/ou aromatiques.

-(7) les polymères à squelette aminoplaste éther possédant au moins une chaîne grasse, tels que les composés PURE THIX® proposés par la société SUD-CHEMIE.

5 De préférence, les polyéthers polyuréthanes comportent au moins deux chaînes lipophiles hydrocarbonées, ayant de 6 à 30 atomes de carbone, séparées par une séquence hydrophile, les chaînes hydrocarbonées pouvant être des chaînes pendantes ou des chaînes en bout de séquence hydrophile. En particulier, il est possible qu'une ou
10 plusieurs chaînes pendantes soient prévues. En outre, le polymère peut comporter, une chaîne hydrocarbonée à un bout ou aux deux bouts d'une séquence hydrophile.

15 Les polyéthers polyuréthanes peuvent être multiséquencés en particulier sous forme de tribloc. Les séquences hydrophobes peuvent être à chaque extrémité de la chaîne (par exemple : copolymère tribloc à séquence centrale hydrophile) ou réparties à la fois aux extrémités et dans la chaîne (copolymère multiséquencé par exemple). Ces mêmes polymères peuvent être également en greffons ou en étoile.

20 Les polyéthers polyuréthanes non-ioniques à chaîne grasse peuvent être des copolymères triblocs dont la séquence hydrophile est une chaîne polyoxyéthylénée comportant de 50 à 1000 groupements oxyéthylénés. Les polyéthers polyuréthanes non-ioniques comportent une liaison uréthane entre les séquences hydrophiles, d'où l'origine du nom.

25 Par extension figurent aussi parmi les polyéthers polyuréthanes non-ioniques à chaîne grasse ceux dont les séquences hydrophiles sont liées aux séquences lipophiles par d'autres liaisons chimiques.

30 A titre d'exemples de polyéthers polyuréthanes non-ioniques à chaîne grasse utilisables dans l'invention, on peut aussi utiliser aussi le Rhéolate 205® à fonction urée vendu par la société RHEOX ou encore les Rhéolates® 208, 204 ou 212, ainsi que l'Acrysol RM 184®.

On peut également citer le produit ELFACOS T210® à chaîne alkyle en C₁₂₋₁₄ et le produit ELFACOS T212® à chaîne alkyle en C₁₈ de chez AKZO.

Le produit DW 1206B® de chez ROHM & HAAS à chaîne alkyle en C₂₀ et à liaison uréthane, proposé à 20 % en matière sèche dans l'eau, peut aussi être utilisé.

5 On peut aussi utiliser des solutions ou dispersions de ces polymères notamment dans l'eau ou en milieu hydroalcoolique. A titre d'exemple, de tels polymères on peut citer, le Rhéolate® 255, le Rhéolate® 278 et le Rhéolate® 244 vendus par la société RHEOX. On peut aussi utiliser le produit DW 1206F et le DW 1206J proposés par la société ROHM & HAAS.

10 Les polyéthers polyuréthanes utilisables selon l'invention sont en particulier ceux décrits dans l'article de G. Fonnum, J. Bakke et Fk. Hansen - Colloid Polym. Sci 271, 380.389 (1993).

15 Plus particulièrement encore on préfère utiliser un polyéther polyuréthane susceptible d'être obtenu par polycondensation d'au moins trois composés comprenant (i) au moins un polyéthylèneglycol comprenant de 150 à 180 moles d'oxyde d'éthylène, (ii) de l'alcool stéarylique ou de l'alcool décylrique et (iii) au moins un diisocyanate.

20 De tels polyéther polyuréthanes sont vendus notamment par la société ROHM & HAAS sous les appellations Aculyn 46® et Aculyn 44® [l'ACULYN 46® est un polycondensat de polyéthylèneglycol à 150 ou 180 moles d'oxyde d'éthylène, d'alcool stéarylique et de méthylène bis(4-cyclohexyl-isocyanate) (SMDI), à 15% en poids dans une matrice de maltodextrine (4%) et d'eau (81%); l'ACULYN 44® est un polycondensat de polyéthylèneglycol à 150 ou 180 moles d'oxyde d'éthylène, d'alcool décylrique et de méthylène bis(4-cyclohexylisocyanate) (SMDI), à 35% en poids dans un mélange de propylèneglycol (39%) et d'eau (26%)].

25 Selon un troisième mode préféré, la composition selon la présente invention contient en outre au moins un tensioactif.

30 Les tensioactifs convenant à la mise en oeuvre de la présente invention sont notamment les suivants :

(i) Tensioactif(s) anionique(s) :

A titre d'exemple de tensio-actifs anioniques utilisables, seuls ou mélanges, dans le cadre de la présente invention, on peut citer

notamment (liste non limitative) les sels (en particulier sels alcalins, notamment de sodium, sels d'ammonium, sels d'amines, sels d'ainoalcools ou sels de magnésium) des composés suivants : les alkylsulfates, les alkyléthersulfates, alkylamidoéthersulfates, alkylarylpolyéthersulfates, monoglycérides sulfates ; les alkylsulfonates, alkylphosphates, alkylamidesulfonates, alkylarylsulfonates, α -oléfine-sulfonates, paraffine-sulfonates ; les alkyl(C₆-C₂₄) sulfosuccinates, les alkyl(C₆-C₂₄) éthersulfosuccinates, les alkyl(C₆-C₂₄) amidesulfosuccinates ; les alkyl(C₆-C₂₄) sulfoacétates ; les acyl(C₆-C₂₄) sarcosinates et les acyl(C₆-C₂₄) glutamates. On peut également utiliser les esters d'alkyl(C₆-C₂₄)polyglycosides carboxyliques tels que les alkylglucoside citrates, les alkylpolyglycoside tartrate et les alkylpolyglycoside sulfosuccinates., les alkylsulfosuccinamates ; les acyliséthionates et les N-acyltaurates, le radical alkyle ou acyle de tous ces différents composés comportant de préférence de 12 à 20 atomes de carbone, et le radical aryl désignant de préférence un groupement phényle ou benzyle. Parmi les tensioactifs anioniques encore utilisables, on peut également citer les sels d'acides gras tels que les sels des acides oléique, ricinoléique, palmitique, stéarique, les acides d'huile de coprah ou d'huile de coprah hydrogénée ; les acyl-lactylates dont le radical acyle comporte 8 à 20 atomes de carbone. On peut également utiliser les acides d'alkyl D galactoside uroniques et leurs sels, les acides alkyl (C₆-C₂₄) éther carboxyliques polyoxyalkylénés, les acides alkyl(C₆-C₂₄) aryl éther carboxyliques polyoxyalkylénés, les acides alkyl(C₆-C₂₄) amido éther carboxyliques polyoxyalkylénés et leurs sels, en particulier ceux comportant de 2 à 50 groupements oxyde d'alkylène en particulier d'éthylène, et leurs mélanges.

(ii) Tensioactif(s) non ionique(s) :


Les agents tensioactifs non-ioniques sont, eux aussi, des composés bien connus en soi (voir notamment à cet égard "Handbook of Surfactants" par M.R. PORTER, éditions Blackie & Son (Glasgow and London), 1991, pp 116-178) et leur nature ne revêt pas, dans le cadre de la présente invention, de caractère critique. Ainsi, ils peuvent être notamment choisis parmi (liste non limitative) les alcools, les alpha-

diols, les alkylphénols polyéthoxylés, polypropoxylés, ayant une chaîne grasse comportant par exemple 8 à 18 atomes de carbone, le nombre de groupements oxyde d'éthylène ou oxyde de propylène pouvant aller notamment de 2 à 50. On peut également citer les copolymères d'oxyde d'éthylène et de propylène, les condensats d'oxyde d'éthylène et de propylène sur des alcools gras ; les amides gras polyéthoxylés ayant de préférence de 2 à 30 moles d'oxyde d'éthylène, les amides gras polyglycérolés comportant en moyenne 1 à 5 groupements glycérol et en particulier 1,5 à 4 ; les esters d'acides gras du sorbitan oxyéthylénés ayant de 2 à 30 moles d'oxyde d'éthylène ; les esters d'acides gras du sucrose, les esters d'acides gras du polyéthylèneglycol, les alkylpolyglycosides, les dérivés de N-alkyl glucamine, les oxydes d'amines tels que les oxydes d'alkyl ($C_{10} - C_{14}$) amines ou les oxydes de N-acylaminopropylmorpholine.

15 (iii) Tensioactif(s) amphotère(s) ou zwitterionique(s) :

Les agents tensioactifs amphotères ou zwitterioniques, dont la nature ne revêt pas dans le cadre de la présente invention de caractère critique, peuvent être notamment (liste non limitative) des dérivés d'amines secondaires ou tertiaires aliphatiques, dans lesquels le radical aliphatique est une chaîne linéaire ou ramifiée comportant 8 à 18 atomes de carbone et contenant au moins un groupe anionique hydrosolubilisant (par exemple carboxylate, sulfonate, sulfate, phosphate ou phosphonate) ; on peut citer encore les alkyl ($C_8 - C_{20}$) bétaïnes, les sulfobétaïnes, les alkyl ($C_8 - C_{20}$) amidoalkyl ($C_1 - C_6$) bétaïnes ou les alkyl ($C_8 - C_{20}$) amidoalkyl ($C_1 - C_6$) sulfobétaïnes.

Parmi les dérivés d'amines, on peut citer les produits vendus sous la dénomination MIRANOL, tels que décrits dans les brevets US-2 528 378 et US-2 781 354 et classés dans le dictionnaire CTFA, 3ème édition, 1982, sous les dénominations Amphocarboxyglycinates et Amphocarboxypropionates de structures respectives :



dans laquelle : R_2 désigne un radical alkyle d'un acide $R_2 - \text{COOH}$ présent dans l'huile de coprah hydrolysée, un radical heptyle, nonyle ou

undécyle, R_3 désigne un groupement bêta-hydroxyéthyle et R_4 un groupement carboxyméthyle ;

et

R_2' -CONHCH₂CH₂-N(B)(C)

5 dans laquelle :

B représente -CH₂CH₂OX', C représente -(CH₂)_z -Y', avec $z = 1$ ou 2,

X' désigne le groupement -CH₂CH₂-COOH ou un atome d'hydrogène

10 Y' désigne -COOH ou le radical -CH₂ - CHOH - SO₃H

R_2' désigne un radical alkyle d'un acide R_9 -COOH présent dans l'huile de coprah ou dans l'huile de lin hydrolysée, un radical alkyle, notamment en C₇, C₉, C₁₁ ou C₁₃, un radical alkyle en C₁₇ et sa forme iso, un radical C₁₇ insaturé.

15 Ces composés sont classés dans le dictionnaire CTFA, 5ème édition, 1993, sous les dénominations Disodium Cocoamphodiacetate, Disodium Lauroamphodiacetate, Disodium Caprylamphodiacetate, Disodium Capryloamphodiacetate, Disodium Cocoamphodipropionate, Disodium Lauroamphodipropionate, Disodium Caprylamphodipropionate, Disodium Capryloamphodipropionate, Lauroamphodipropionic acid, Cocoamphodipropionic acid.

20 A titre d'exemple on peut citer le cocoamphodiacetate commercialisé sous la dénomination commerciale MIRANOL® C2M concentré par la société RHODIA CHIMIE.

25 (iv) Tensioactifs cationiques :

30 Parmi les tensioactifs cationiques on peut citer en particulier (liste non limitative) : les sels d'amines grasses primaires, secondaires ou tertiaires, éventuellement polyoxyalkylénées ; les sels d'ammonium quaternaire tels que les chlorures ou les bromures de tétraalkylammonium, d'alkylamidoalkyltrialkylammonium, de trialalkylbenzylammonium, de trialalkylhydroxyalkyl-ammonium ou d'alkylpyridinium ; les dérivés d'imidazoline ; ou les oxydes d'amines à caractère cationique.

Les quantités d'agents tensioactifs présents dans la composition selon l'invention peuvent varier de 0,01 à 40% et de préférence de 0,5 à 30% du poids total de la composition.

5 La composition de la présente invention peut en outre comprendre une ou plusieurs bases d'oxydation additionnelles classiquement utilisées en teinture d'oxydation autres que les paraphénylènediamines de formule I. A titre d'exemple, ces bases d'oxydation additionnelles sont choisies parmi les phénylènediamines, les bis-phénylalkylènediamines, les para-aminophénols, les ortho-aminophénols, les bases hétérocycliques autres que les paraphénylènediamines hétérocycliques et leurs sels d'addition.

10 Parmi les paraphénylènediamines, on peut citer à titre d'exemple, la paraphénylènediamine, la paratoluylènediamine, la 2-chloro paraphénylènediamine, la 2,3-diméthyl paraphénylènediamine, la 2,6-diméthyl paraphénylènediamine, la 2,6-diéthyl paraphénylènediamine, la 2,5-diméthyl paraphénylènediamine, la N,N-diméthyl paraphénylènediamine, la N,N-diéthyl paraphénylènediamine, la N,N-dipropyl paraphénylènediamine, la 4-amino N,N-diéthyl 3-méthyl aniline, la N,N-bis-(β -hydroxyéthyl) paraphénylènediamine, la 4-N,N-bis-(β -hydroxyéthyl)amino 2-méthyl aniline, la 4-N,N-bis-(β -hydroxyéthyl)amino 2-chloro aniline, la 2- β -hydroxyéthyl paraphénylènediamine, la 2-fluoro paraphénylènediamine, la 2-isopropyl paraphénylènediamine, la N-(β -hydroxypropyl) paraphénylènediamine, la 2-hydroxyméthyl paraphénylènediamine, la N,N-diméthyl 3-méthyl paraphénylènediamine, la N,N-(éthyl, β -hydroxyéthyl) paraphénylènediamine, la N-(β,γ -dihydroxypropyl) paraphénylènediamine, la N-(4'-aminophényl) paraphénylènediamine, la N-phényl paraphénylènediamine, la 2- β -hydroxyéthoxy paraphénylènediamine, la 2- β -acétylaminoéthoxy paraphénylènediamine, la N-(β -méthoxyéthyl) paraphénylène-diamine, la 4-aminophénylpyrrolidine, la 2-thiényle paraphénylènediamine, le 2- β hydroxyéthylamino 5-amino toluène, la 3-hydroxy 1-(4'-aminophényl)pyrrolidine et leurs sels d'addition avec un acide.

Parmi les paraphénylènediamines citées ci-dessus, la paraphénylènediamine, la paratoluylènediamine, la 2-isopropyl paraphénylènediamine, la 2- β -hydroxyéthyl paraphénylènediamine, la 2- β -hydroxyéthoxy paraphénylène-diamine, la 2,6-diméthyl paraphénylènediamine, la 2,6-diéthyl paraphénylènediamine, la 2,3-diméthyl paraphénylènediamine, la N,N-bis-(β -hydroxyéthyl) paraphénylènediamine, la 2-chloro paraphénylènediamine, la 2- β -acétylaminoéthoxy paraphénylènediamine, et leurs sels d'addition avec un acide sont particulièrement préférées.

10. Parmi les bis-phénylalkylènediamines, on peut citer à titre d'exemple, le N,N'-bis-(β -hydroxyéthyl) N,N'-bis-(4'-aminophényl) 1,3-diamino propanol, la N,N'-bis-(β -hydroxyéthyl) N,N'-bis-(4'-aminophényl) éthylènediamine, la N,N'-bis-(4-aminophényl) tétraméthylènediamine, la N,N'-bis-(β -hydroxyéthyl) N,N'-bis-(4-aminophényl) tétraméthylènediamine, la N,N'-bis-(4-méthyl-aminophényl) tétraméthylènediamine, la N,N'-bis-(éthyl) N,N'-bis-(4-amino, 3'-méthylphényl) éthylènediamine, le 1,8-bis-(2,5-diamino phénoxy)-3,6-dioxaoctane, et leurs sels d'addition.

15. Parmi les para-aminophénols, on peut citer à titre d'exemple, le para-aminophénol, le 4-amino 3-méthyl phénol, le 4-amino 3-fluoro phénol, le 4-amino-3-chlorophénol, le 4-amino 3-hydroxyméthyl phénol, le 4-amino 2-méthyl phénol, le 4-amino 2-hydroxyméthyl phénol, le 4-amino 2-méthoxyméthyl phénol, le 4-amino 2-aminométhyl phénol, le 4-amino 2-(β -hydroxyéthyl aminométhyl) phénol, le 4-amino 2-fluoro phénol, et leurs sels d'addition avec un acide.

20. Parmi les ortho-aminophénols, on peut citer à titre d'exemple, le 2-amino phénol, le 2-amino 5-méthyl phénol, le 2-amino 6-méthyl phénol, le 5-acétamido 2-amino phénol, et leurs sels d'addition.

25. Parmi les bases hétérocycliques, on peut citer à titre d'exemple, les dérivés pyridiniques, les dérivés pyrimidiniques et les dérivés pyrazoliques.

30. Parmi les dérivés pyridiniques, on peut citer les composés décrits par exemple dans les brevets GB 1 026 978 et GB 1 153 196, comme la

2,5-diamino pyridine, la 2-(4-méthoxyphényl)amino 3-amino pyridine, la 3,4-diamino pyridine, et leurs sels d'addition.

D'autres bases d'oxydation pyridiniques utiles dans la présente invention sont les bases d'oxydation 3-amino pyrazolo-[1,5-a]-pyridines ou leurs sels d'addition décrits par exemple dans la demande de brevet FR 2801308. A titre d'exemple, on peut citer la pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-ylamine ; la 2-acétylamino pyrazolo-[1,5-a] pyridin-3-ylamine ; la 2-morpholin-4-yl-pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-ylamine ; l'acide 3-amino-pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carboxylique ; la 2-méthoxy-pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-ylamino ; le (3-amino-pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-yl)-méthanol ; le 2-(3-amino-pyrazolo[1,5-a]pyridine-5-yl)-éthanol ; le 2-(3-amino-pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-yl)-éthanol ; le (3-amino-pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-yl)-méthanol ; la 3,6-diamino-pyrazolo[1,5-a]pyridine ; la 3,4-diamino-pyrazolo[1,5-a]pyridine ; la pyrazolo[1,5-a]pyridine-3,7-diamine ; la 7-morpholin-4-yl-pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-ylamine ; la pyrazolo[1,5-a]pyridine-3,5-diamine ; la 5-morpholin-4-yl-pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-ylamine ; le 2-[(3-amino-pyrazolo[1,5-a]pyridin-5-yl)-(2-hydroxyéthyl)-amino]-éthanol ; le 2-[(3-amino-pyrazolo[1,5-a]pyridin-7-yl)-(2-hydroxyéthyl)-amino]-éthanol ; la 3-amino-pyrazolo[1,5-a]pyridine-5-ol ; 3-amino-pyrazolo[1,5-a]pyridine-4-ol ; la 3-amino-pyrazolo[1,5-a]pyridine-6-ol ; la 3-amino-pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-ol ; ainsi que leurs sels d'addition.

Parmi les dérivés pyrimidiniques, on peut citer les composés décrits par exemple dans les brevets DE 2359399 ; JP 88-169571 ; JP 05-63124 ; EP 0770375 ou demande de brevet WO 96/15765 comme la 2,4,5,6-tétra-aminopyrimidine, la 4-hydroxy 2,5,6-triaminopyrimidine, la 2-hydroxy 4,5,6-triaminopyrimidine, la 2,4-dihydroxy 5,6-diaminopyrimidine, la 2,5,6-triaminopyrimidine et leurs sels d'addition et leurs formes tautomères, lorsqu'il existe un équilibre tautomérique.

Parmi les dérivés pyrazoliques, on peut citer les composés décrits dans les brevets DE 3843892, DE 4133957 et demandes de brevet WO 94/08969, WO 94/08970, FR-A-2 733 749 et DE 195 43 988 comme le 4,5-diamino 1-méthyl pyrazole, le 4,5-diamino 1-(β -hydroxyéthyl)

pyrazole, le 3,4-diamino pyrazole, le 4,5-diamino 1-(4'-chlorobenzyl) pyrazole, le 4,5-diamino 1,3-diméthyl pyrazole, le 4,5-diamino 3-méthyl 1-phényl pyrazole, le 4,5-diamino 1-méthyl 3-phényl pyrazole, le 4-amino 1,3-diméthyl 5-hydrazino pyrazole, le 1-benzyl 4,5-diamino 3-méthyl pyrazole, le 4,5-diamino 3-tert-butyl 1-méthyl pyrazole, le 4,5-diamino 1-tert-butyl 3-méthyl pyrazole, le 4,5-diamino 1-(β -hydroxyéthyl) 3-méthyl pyrazole, le 4,5-diamino 1-éthyl 3-méthyl pyrazole, le 4,5-diamino 1-éthyl 3-(4'-méthoxyphényl) pyrazole, le 4,5-diamino 1-éthyl 3-hydroxyméthyl pyrazole, le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-méthyl pyrazole, le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-isopropyl pyrazole, le 4,5-diamino 3-méthyl 1-isopropyl pyrazole, le 4-amino 5-(2'-aminoéthyl)amino 1,3-diméthyl pyrazole, le 3,4,5-triamino pyrazole, le 1-méthyl 3,4,5-triamino pyrazole, le 3,5-diamino 1-méthyl 4-méthylamino pyrazole, le 3,5-diamino 4-(β -hydroxyéthyl)amino 1-méthyl pyrazole, et leurs sels d'addition.

La ou les bases d'oxydation additionnelles présentes dans la composition de l'invention sont en général présentes en quantité comprise allant de 0,001 à 20 % en poids environ du poids total de la composition tinctoriale, de préférence allant de 0,005 à 6 %.

La composition selon l'invention contient de préférence un ou plusieurs coupleurs additionnels conventionnellement utilisés pour la teinture de fibres kératiniques. Parmi ces coupleurs, on peut notamment citer les métaphénylènediamines, les métadiphénols, les coupleurs naphtaléniques, les coupleurs hétérocycliques ainsi que leur sels d'addition.

A titre d'exemple, on peut citer le 1,3-dihydroxy benzène, le 1,3-dihydroxy 2-méthyl benzène, le 4-chloro 1,3-dihydroxy benzène, le 2,4-diamino 1-(β -hydroxyéthoxy) benzène, le 2-amino 4-(β -hydroxyéthylamino) 1-méthoxybenzène, le 1,3-diamino benzène, le 1,3-bis-(2,4-diaminophénoxy) propane, la 3-uréido aniline, le 3-uréido 1-diméthylamino benzène, le sésamol, le 1- β -hydroxyéthylamino-3,4-méthylènedioxybenzène, l' α -naphtol, le 2 méthyl-1-naphtol, le 6-hydroxy indole, le 4-hydroxy indole, le 4-hydroxy N-méthyl indole, la 2-amino-3-hydroxy pyridine, la 6-hydroxy benzomorpholine la 3,5-

diamino-2,6-diméthoxypyridine, le 1-N-(β -hydroxyéthyl)amino-3,4-méthylène dioxybenzène, le 2,6-bis-(β -hydroxyéthylamino)toluène et leurs sels d'addition.

5 Dans la composition de la présente invention, le ou les coupleurs sont généralement présents en quantité comprise allant de 0,001 à 20 % en poids environ du poids total de la composition tinctoriale, de préférence allant de 0,005 à 6 %.

10 D'une manière générale, les sels d'addition des bases d'oxydation et des coupleurs utilisables dans le cadre de l'invention sont notamment choisis parmi les sels d'addition avec un acide tels que les chlorhydrates, les bromhydrates, les sulfates, les citrates, les succinates, les tartrates, les lactates, les tosylates, les benzènesulfonates, les phosphates et les acétates et les sels d'addition avec une base telles que la soude, la potasse, l'ammoniaque, les amines ou les alcanolamines.

15 La composition tinctoriale conforme à l'invention peut en outre contenir un ou plusieurs colorants directs pouvant notamment être choisis parmi les colorants nitrés de la série benzénique, neutres, acides ou cationiques, les colorants directs azoïques neutres acides ou cationiques, les colorants directs quinoniques et en particulier
20 anthraquinoniques neutres, acides ou cationiques, les colorants directs aziniques, les colorants directs triarylméthaniques, les colorants directs indoaminiques et les colorants directs naturels.

25 Parmi les colorants directs benzéniques utilisables selon l'invention, on peut citer de manière non limitative les composés suivants :

- 1,4-diamino-2-nitrobenzène,
- 1-amino-2 nitro-4- β -hydroxyéthylaminobenzène
- 1-amino-2 nitro-4-bis(β -hydroxyéthyl)-aminobenzène
- 1,4-Bis(β -hydroxyéthylamino)-2-nitrobenzène
- 30 - 1- β -hydroxyéthylamino-2-nitro-4-bis-(β -hydroxyéthylamino)-benzène
- 1- β -hydroxyéthylamino-2-nitro-4-aminobenzène
- 1- β -hydroxyéthylamino-2-nitro-4-(éthyl)(β -hydroxyéthyl)-aminobenzène

- 1-amino-3-méthyl-4- β -hydroxyéthylamino-6-nitrobenzène
- 1-amino-2-nitro-4- β -hydroxyéthylamino-5-chlorobenzène
- 1,2-Diamino-4-nitrobenzène
- 1-amino-2- β -hydroxyéthylamino-5-nitrobenzène
- 5 - 1,2-Bis-(β -hydroxyéthylamino)-4-nitrobenzène
- 1-amino-2-tris-(hydroxyméthyl)-méthylamino-5-nitrobenzène
- 1-Hydroxy-2-amino-5-nitrobenzène
- 1-Hydroxy-2-amino-4-nitrobenzène
- 1-Hydroxy-3-nitro-4-aminobenzène
- 10 - 1-Hydroxy-2-amino-4,6-dinitrobenzène
- 1- β -hydroxyéthoxy-2- β -hydroxyéthylamino-5-nitrobenzène
- 1-Méthoxy-2- β -hydroxyéthylamino-5-nitrobenzène
- 1- β -hydroxyéthoxy-3-méthylamino-4-nitrobenzène
- 1- β , γ -dihydroxypropyloxy-3-méthylamino-4-nitrobenzène
- 15 - 1- β -hydroxyéthylamino-4- β , γ -dihydroxypropyloxy-2-nitrobenzène
- 1- β , γ -dihydroxypropylamino-4-trifluorométhyl-2-nitrobenzène
- 1- β -hydroxyéthylamino-4-trifluorométhyl-2-nitrobenzène
- 1- β -hydroxyéthylamino-3-méthyl-2-nitrobenzène
- 1- β -aminoéthylamino-5-méthoxy-2-nitrobenzène
- 20 - 1-Hydroxy-2-chloro-6-éthylamino-4-nitrobenzène
- 1-Hydroxy-2-chloro-6-amino-4-nitrobenzène
- 1-Hydroxy-6-bis-(β -hydroxyéthyl)-amino-3-nitrobenzène
- 1- β -hydroxyéthylamino-2-nitrobenzène
- 1-Hydroxy-4- β -hydroxyéthylamino-3-nitrobenzène.

25 Parmi les colorants directs azoïques utilisables selon l'invention on peut citer les colorants azoïques cationiques décrits dans les demandes de brevets WO 95/15144, WO-95/01772 et EP-714954 dont le contenu fait partie intégrante de l'invention.

Parmi ces composés on peut tout particulièrement citer les

30 colorants suivants :

- chlorure de 1,3-diméthyl-2-[[4-(diméthylamino)phényl]azo]-1H-Imidazolium,
- chlorure de 1,3-diméthyl-2-[(4-aminophényl)azo]-1H-Imidazolium,

- méthylsulfate de 1-méthyl-4-
 [(méthylphénylhydrazono)méthyl]-pyridinium.

On peut également citer parmi les colorants directs azoïques les colorants suivants, décrits dans le COLOUR INDEX INTERNATIONAL 3e édition :

5

-Disperse Red 17

-Acid Yellow 9

-Acid Black 1

-Basic Red 22

10

-Basic Red 76

-Basic Yellow 57

-Basic Brown 16

-Acid Yellow 36

-Acid Orange 7

15

-Acid Red 33

-Acid Red 35

-Basic Brown 17

-Acid Yellow 23

-Acid Orange 24

20

-Disperse Black 9.

On peut aussi citer le 1-(4'-aminodiphénylazo)-2-méthyl-4bis-(β -hydroxyéthyl) aminobenzène et l'acide 4-hydroxy-3-(2-méthoxyphénylazo)-1-naphtalène sulfonique.

25

Parmi les colorants directs quinoniques on peut citer les colorants suivants :

-Disperse Red 15

-Solvent Violet 13

-Acid Violet 43

-Disperse Violet 1

30

-Disperse Violet 4

-Disperse Blue 1

-Disperse Violet 8

-Disperse Blue 3

-Disperse Red 11

- Acid Blue 62
- Disperse Blue 7
- Basic Blue 22
- Disperse Violet 15
- 5 -Basic Blue 99

ainsi que les composés suivants :

- 1-N-méthylmorpholiniumpropylamino-4-hydroxyanthraquinone
- 1-Aminopropylamino-4-méthylaminoanthraquinone
- 1-Aminopropylaminoanthraquinone
- 10 -5- β -hydroxyéthyl-1,4-diaminoanthraquinone
- 2-Aminoéthylaminoanthraquinone
- 1,4-Bis-(β , γ -dihydroxypropylamino)-anthraquinone.

Parmi les colorants aziniques on peut citer les composés suivants :

- 15 -Basic Blue 17

-Basic Red 2.

Parmi les colorants triarylméthaniques utilisables selon l'invention, on peut citer les composés suivants :

- Basic Green 1
- 20 -Acid blue 9
- Basic Violet 3
- Basic Violet 14
- Basic Blue 7
- Acid Violet 49
- 25 -Basic Blue 26
- Acid Blue 7

Parmi les colorants indoaminiques utilisables selon l'invention, on peut citer les composés suivants :

- 2- β -hydroxyéthylamino-5-[bis-(β -4'-hydroxyéthyl)amino]anilino-
- 30 1,4-benzoquinone
- 2- β -hydroxyéthylamino-5-(2'-méthoxy-4'-amino)anilino-1,4-benzoquinone
- 3-N(2'-Chloro-4'-hydroxy)phényl-acétylamino-6-méthoxy-1,4-benzoquinone imine

- 3-N(3'-Chloro-4'-méthylamino)phényl-uréido-6-méthyl-1,4-benzoquinone imine
- 3-[4'-N-(Ethyl,carbamylméthyl)-amino]-phényl-uréido-6-méthyl-1,4-benzoquinone imine

5 Parmi les colorants directs naturels utilisables selon l'invention, on peut citer la lawsone, la juglone, l'alizarine, la purpurine, l'acide carminique, l'acide kermésique, la purpurogalline, le protocatéchaldéhyde, l'indigo, l'isatine, la curcumine, la spinulosine, l'apigénidine. On peut également utiliser les extraits ou décoctions
10 contenant ces colorants naturels et notamment les cataplasmes ou extraits à base de henné.

 Le ou les colorants directs représentent de préférence de 0,001 à 20% en poids environ du poids total de la composition prête à l'emploi et encore plus préférentiellement de 0,005 à 10% en poids environ.

15 La composition selon l'invention peut également contenir au moins un solvant hydroxylé, tels que notamment l'éthanol, le propylèneglycol, le glycérol, les monoéthers de polyols, l'alcool benzylique.

 Elle peut aussi contenir un solvant non hydroxylé.

20 Les solvants hydroxylés et les solvants non hydroxylés sont, de préférence, présents dans des proportions de préférence comprises entre 1 et 40 % en poids environ par rapport au poids total de la composition tinctoriale, et encore plus préférentiellement entre 5 et 30 % en poids environ.

25 La composition tinctoriale conforme à l'invention peut également renfermer divers adjuvants utilisés classiquement dans les compositions pour la teinture des cheveux, tels que des agents antioxydants, des agents de pénétration, des agents séquestrants, des parfums, des tampons, des agents dispersants, des agents de conditionnement tels que par exemple
30 des silicones volatiles ou non volatiles, modifiées ou non modifiées, des agents filmogènes, des céramides, des agents conservateurs, des agents opacifiants.


Les adjuvants ci dessus sont en général présents en quantité comprise pour chacun d'eux entre 0,01 et 20 % en poids par rapport au poids de la composition.

5 Bien entendu, l'homme de l'art veillera à choisir ce ou ces éventuels composés complémentaires de manière telle que les propriétés avantageuses attachées intrinsèquement à la composition de teinture d'oxydation conforme à l'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, altérées par la ou les adjonctions envisagées.

10 Le pH de la composition tinctoriale conforme à l'invention est généralement compris entre 3 et 12 environ, et de préférence entre 5 et 11 environ. Il peut être ajusté à la valeur désirée au moyen d'agents acidifiants ou alcalinisants habituellement utilisés en teinture des fibres kératiniques ou bien encore à l'aide de systèmes tampons classiques.

15 Parmi les agents acidifiants, on peut citer, à titre d'exemple, les acides minéraux ou organiques comme l'acide chlorhydrique, l'acide orthophosphorique, l'acide sulfurique, les acides carboxyliques comme l'acide acétique, l'acide tartrique, l'acide citrique, l'acide lactique, les acides sulfoniques.

20 Parmi les agents alcalinisants on peut citer, à titre d'exemple, l'ammoniaque, les carbonates alcalins, les alcanolamines telles que les mono-, di- et triéthanolamines ainsi que leurs dérivés, les hydroxydes de sodium ou de potassium et les composés de formule (XXIII) suivante :



(XXIII)

25 dans laquelle W est un reste propylène éventuellement substitué par un groupement hydroxyle ou un radical alkyle en C₁-C₄ ; Ra, Rb, Rc et Rd, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₄ ou hydroxyalkyle en C₁-C₄.

30

La composition tinctoriale selon l'invention peut se présenter sous des formes diverses, telles que sous forme de liquides, de crèmes, de gels, ou sous toute autre forme appropriée pour réaliser une teinture des fibres kératiniques, et notamment des cheveux humains.

5 Le procédé de la présente invention est un procédé dans lequel on applique sur les fibres la composition selon la présente invention telle que définie précédemment, et qu'on révèle la couleur à l'aide d'un agent oxydant. La couleur peut être révélée à pH acide, neutre ou alcalin et l'agent oxydant peut être ajouté à la composition de l'invention juste au
10 moment de l'emploi ou il peut être mis en œuvre à partir d'une composition oxydante le contenant, appliquée simultanément ou séquentiellement à la composition de l'invention.

Selon un mode de réalisation particulier, la composition selon la présente invention est mélangée, de préférence au moment de l'emploi, à
15 une composition contenant, dans un milieu approprié pour la teinture, au moins un agent oxydant, cet agent oxydant étant présent en une quantité suffisante pour développer une coloration. Le mélange obtenu est ensuite appliqué sur les fibres kératiniques. Après un temps de pose de 3 à 50 minutes environ, de préférence 5 à 30 minutes environ, les fibres
20 kératiniques sont rincées, lavées au shampoing, rincées à nouveau puis séchées.

Les agents oxydants classiquement utilisés pour la teinture d'oxydation des fibres kératiniques sont par exemple le peroxyde d'hydrogène, le peroxyde d'urée, les bromates de métaux alcalins, les
25 persels tels que les perborates et persulfates, les peracides et les enzymes oxydases parmi lesquelles on peut citer les peroxydases, les oxydo-réductases à 2 électrons telles que les uricases et les oxygénases à 4 électrons comme les laccases. Le peroxyde d'hydrogène est particulièrement préféré.

30 La composition oxydante peut également renfermer divers adjuvants utilisés classiquement dans les compositions pour la teinture des cheveux et tels que définis précédemment.

Le pH de la composition oxydante renfermant l'agent oxydant est tel qu'après mélange avec la composition tinctoriale, le pH de la

composition résultante appliquée sur les fibres kératiniques varie de préférence entre 3 et 12 environ, et encore plus préférentiellement entre 5 et 11. Il peut être ajusté à la valeur désirée au moyen d'agents acidifiants ou alcalinisants habituellement utilisés en teinture des fibres
5 kératiniques et tels que définis précédemment.

La composition prête à l'emploi qui est finalement appliquée sur les fibres kératiniques peut se présenter sous des formes diverses, telles que sous forme de liquides, de crèmes, de gels ou sous toute autre forme appropriée pour réaliser une teinture des fibres kératiniques, et
10 notamment des cheveux humains.

L'invention a aussi pour objet un dispositif à plusieurs compartiments ou "kit" de teinture dans lequel un premier compartiment renferme la composition tinctoriale définie ci-dessus et un deuxième compartiment renferme une composition oxydante. Ce dispositif peut
15 être équipé d'un moyen permettant de délivrer sur les cheveux le mélange souhaité, tel que les dispositifs décrits dans le brevet FR-2 586 913 au nom de la demanderesse.

A partir de ce dispositif, il est possible de teindre les fibres kératiniques à partir d'un procédé qui comprend le mélange d'une
20 composition tinctoriale conforme à l'invention avec un agent oxydant tel que défini précédemment, et l'application du mélange obtenu sur les fibres kératiniques pendant un temps suffisant pour développer la coloration désirée.

Les exemples qui suivent servent à illustrer l'invention sans
25 toutefois présenter un caractère limitatif.

EXEMPLES DE COMPOSITION SELON L'INVENTION

Exemple 1 :

Composition colorante : (exprimée en grammes)

5

Alcool oléique	6
Acide oléique	3
Alcool oléique polyglycérolé à 2 moles de glycérol	6
Alcool oléique polyglycérolé à 6 moles de glycérol	6
Laurylaminosuccinamate de diéthylaminopropyle, sel de sodium	3
Amine oléique oxyéthylénée à 2 moles d'oxyde éthylène	7
Monoéthanolamide d'acide alkyl éther carboxylique à 2 moles d'oxyde d'éthylène	10
Acétate d'ammonium	20
Héxylèneglycol	20
Réducteurs, antioxydants	0,915
Séquestrants	1
[1-(4-aminophényl)-pyrrolidin-3-yl]-triméthyl-ammonium, chlorure	0,8
ACP 1234 (ISP)	0,2 M.A.
2-méthyl-5-amino-phénol	0,5
Parfum	qs
Ammoniaque (à 20,5% en ammoniac)	10,2
Eau déminéralisée qsp	100

10

Au moment de l'emploi, on mélange poids pour poids cette composition avec un lait oxydant à 6% de peroxyde d'hydrogène. On applique pendant 30 minutes le mélange obtenu sur des cheveux gris à 90% de blancs. On obtient sur ces cheveux après rinçage, shampooing et séchage une coloration brun violet.

Exemple 2 :**Composition colorante :** (exprimée en grammes)

Alcool oléique	4
Acide oléique	5
Alcool oléique polyglycérolé à 2 moles de glycérol	4
Alcool laurique polyglycérolé à 4 moles de glycérol	3,6
Amide d'acides de colza oxyéthyléné à 4 moles d'oxyde d'éthylène	8
Amine oléique oxyéthylénée à 2 moles d'oxyde éthylène	4
Alcool décylque oxyéthyléné à 3 moles d'oxyde d'éthylène	2,7
Alcool éthylique	7,45
Propylène glycol	15
Réducteurs, antioxydants	0,63
Séquestrant	1
3-[1-(4-aminophényl)-pyrrolidine-3-yl]-1-méthyl-3H-imidazol-1-ium, chlorure	0,85
5N(β -hydroxyéthyl)amino-2-méthyl-phénol)	0,5
Polyuréthane cationique obtenu à partir de la polycondensation de 1,3bis(isocyanate méthyl cyclohexane), de N,N-diméthyléthanolamine quaternisé avec le bromododécane, de N,N-diméthyléthanolamine et de POE 10 000	0,25
Monoéthanolamine pure	2
Parfum	qs
Ammoniaque (à 20,5% en ammoniac)	10
Eau déminéralisée qsp	100

5


Au moment de l'emploi, on mélange poids pour poids cette composition avec un lait oxydant à 6% de peroxyde d'hydrogène. On applique pendant 30 minutes le mélange obtenu sur des cheveux gris à 90% de blancs. On obtient sur ces cheveux après rinçage, shampooing et séchage une coloration violette.

10

REVENDICATIONS

1. Composition tinctoriale pour la teinture des fibres
kératiniques comprenant dans un milieu de teinture approprié au moins
une paraphénylènediamine tertiaire cationique contenant un noyau
pyrrolidinique et au moins un polymère à chaîne grasse choisi parmi
les polyuréthanes cationiques à chaîne grasse, les celluloses
cationiques à chaîne grasse, les dérivés de polyvinylpyrrolidone
cationiques à chaîne grasse, les polymères anioniques à chaîne grasse
contenant au moins un motif de type ester d'alkyl(C₁₀-C₃₀) d'acide
(méth)acrylique ou au moins un motif éther allyl à chaîne grasse.

2. Composition selon la revendication 1, dans laquelle la
paraphénylène tertiaire cationique correspond à la formule I



(I)

dans laquelle

- n varie de 0 à 4, étant entendu que lorsque n est supérieur ou égal à 2 alors les radicaux R₁ peuvent être identiques ou différents,

- R₁ représente un atome d'halogène ; une chaîne hydrocarbonée en C₁-C₆, aliphatique ou alicyclique, saturée ou insaturée, la chaîne pouvant contenir un ou plusieurs atomes d'oxygène, d'azote, de silicium, de soufre ou un groupement SO₂, et pouvant être substituée par un ou plusieurs radicaux hydroxy ou amino ; un radical onium Z, le radical R₁ ne comportant pas de liaison peroxyde, ni de radicaux diazo, nitro ou nitroso ,

• R_2 représente un radical onium Z ou un radical $-X-C=NR_8-NR_9R_{10}$ dans lequel X représente un atome d'oxygène ou un radical $-NR_{11}$ et R_8, R_9, R_{10} et R_{11} représentent un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C_1-C_4 ou un radical hydroxyalkyle en C_1-C_4 ,

5 • R_3 représente un atome d'hydrogène ou un radical hydroxy.


3. Composition selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle la paraphénylènediamine tertiaire cationique est telle que n est égal à 0.

4. Composition selon l'une des revendications 1 ou 2, dans laquelle la paraphénylènediamine tertiaire cationique est telle que n est égal à 1 et R_1 est choisi dans le groupe formé par un atome d'halogène ; une chaîne hydrocarbonée à C_1-C_6 , aliphatique ou alicyclique, saturée ou insaturée ; un ou plusieurs atomes de carbone pouvant être remplacés par un atome d'oxygène, d'azote, de silicium, de soufre, par un groupement SO_2 , le radical R_1 ne comportant pas de liaison peroxyde, ni de radicaux diazo, nitro ou nitrozo.

15 5. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle la paraphénylènediamine tertiaire cationique est telle que R_1 est choisi parmi le chlore, le brome, les radicaux alkyles en C_1-C_4 , hydroxyalkyles en C_1-C_4 , aminoalkyles en C_1-C_4 , alcoxy en C_1-C_4 , hydroxyalcoxy en C_1-C_4 .

20 6. Composition selon la revendication 5, dans laquelle la paraphénylènediamine tertiaire cationique est telle que R_1 est choisi parmi un radical méthyle, hydroxyméthyle, 2-hydroxyéthyle, 1,2-dihydroxyéthyle, méthoxy, isopropyloxy, 2-hydroxyéthoxy.

25 7. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle la paraphénylènediamine tertiaire cationique est telle que R_2 représente le radical onium Z correspondant à la formule (II)



dans laquelle

• D est une simple liaison ou une chaîne alkylène en C_1-C_{14} , linéaire ou ramifiée pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi l'oxygène, le soufre ou l'azote, et pouvant être substituée par un ou plusieurs radicaux hydroxyle, alcoxy en C_1-C_6 ou amino, et pouvant porter une ou plusieurs fonctions cétone ;

• R_4 , R_5 et R_6 , pris séparément, représentent un radical alkyle en C_1-C_{15} ; un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 ; un radical alcoxy(C_1-C_6)alkyle en C_1-C_6 ; un radical aryle ; un radical benzyle ; un radical amidoalkyle en C_1-C_6 ; un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 ; un radical aminoalkyle en C_1-C_6 ; un radical aminoalkyle en C_1-C_6 dont l'amine est mono- ou di-substituée par un radical alkyle en C_1-C_4 , alkyl(C_1-C_6)carbonyle, amido ou alkyl(C_1-C_6)sulfonyle ; ou

• R_4 , R_5 et R_6 ensemble, deux à deux, forment, avec l'atome d'azote auxquels ils sont rattachés, un cycle saturé carboné à 4, 5, 6 ou 7 chaînons pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes, le cycle cationique pouvant être substitué par un atome d'halogène, un radical hydroxyle, un radical alkyle en C_1-C_6 , un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 , un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 , un radical alcoxy en C_1-C_6 , un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 , un radical amido, un radical carboxyle, un radical alkyl(C_1-C_6)carbonyle, un radical thio (-SH), un radical thioalkyle (-R-SH) en C_1-C_6 , un radical alkyl(C_1-C_6)thio, un radical amino, un radical amino mono ou disubstitué par un radical alkyl(C_1-C_6), alkyl(C_1-C_6)carbonyle, amido ou alkyl(C_1-C_6)sulfonyle ;

• R_7 représente un radical alkyle en C_1-C_6 ; un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 ; un radical aryle ; un radical benzyle ; un radical aminoalkyle en C_1-C_6 ; un radical aminoalkyle en C_1-C_6 dont l'amine est mono- ou di-substituée par un radical alkyl(C_1-C_6), alkyl(C_1-C_6)carbonyle, amido ou alkyl(C_1-C_6)sulfonyle ; un radical carboxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical carbamylalkyle en C_1-C_6 ; un radical trifluoroalkyle en C_1-C_6 ; un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 ; un radical sulfonamidoalkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)carboxyalkyle en

C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)sulfinylalkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)sulfonylalkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)carbonylalkyle en C_1-C_6 ; un radical N-alkyl(C_1-C_6)carbamylalkyle en C_1-C_6 ; un radical N-alkyl(C_1-C_6)sulfonamidoalkyle en C_1-C_6 ;

5

- x est 0 ou 1,

- lorsque $x = 0$, alors le bras de liaison est rattaché à l'atome d'azote portant les radicaux R_4 à R_6 ,

- lorsque $x = 1$, alors deux des radicaux R_4 à R_6 forment conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont rattachés un cycle saturé à 4, 5, 6 ou 7 chaînons et D est lié à un atome de carbone du cycle saturé ;

10

- Y est un contre ion.

8. Composition selon la revendication 7, dans laquelle la paraphénylènediamine tertiaire cationique est telle que R_2 correspond à la formule II dans laquelle x est égal à 0 et R_4 , R_5 et R_6 séparément sont choisis de préférence parmi un radical alkyle en C_1-C_6 , un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_4 , un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_4 , un radical alcoxy(C_1-C_6)alkyle en C_1-C_4 , un radical amidoalkyle en C_1-C_6 , un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 , ou R_4 avec R_5 forment ensemble un cycle azétidine, un cycle pyrrolidine, pipéridine, pipérazine, morpholine, R_6 étant choisi dans ce cas parmi un radical alkyle en C_1-C_6 ; un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 ; un radical aminoalkyle en C_1-C_6 , un radical aminoalkyle mono ou disubstitué par un radical alkyl(C_1-C_6), alkyl(C_1-C_6)carbonyle, amido ou alkyl(C_1-C_6)sulfonyle ; un radical carbamylalkyle en C_1-C_6 ; un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)carboxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)carbonylalkyle en C_1-C_6 ; un radical N-alkyl(C_1-C_6)carbamylalkyle en C_1-C_6 .

15


20

25

30

9. Composition selon la revendication 7, dans laquelle la paraphénylènediamine tertiaire cationique est telle que R_2 correspond à la formule II dans laquelle x est égal à 1 et R_7 est choisi parmi un radical alkyle en C_1-C_6 ; un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 ; un radical aminoalkyle en C_1-C_6 ,

- un radical aminoalkyle en C_1-C_6 dont l'amine est mono ou disubstituée par un radical alkyl(C_1-C_6), alkyl(C_1-C_6)carbonyle, amido ou alkyl(C_1-C_6)sulfonyle ; un radical carbamylalkyle en C_1-C_6 ; un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)carboxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)carbonylalkyle en C_1-C_6 ; un radical N-alkyl(C_1-C_6)carbamylalkyle en C_1-C_6 ; R_4 avec R_5 ensemble forment un cycle azétidine, pyrrolidine, pipéridine, pipérazine, morpholine, R_6 étant choisi dans ce cas parmi un radical alkyle en C_1-C_6 ; un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 ; un radical aminoalkyle en C_1-C_6 , un radical aminoalkyle en C_1-C_6 dont l'amine est mono ou disubstituée par un radical alkyl(C_1-C_6), alkyl(C_1-C_6)carbonyle, amido ou alkyl(C_1-C_6)sulfonyle ; un radical carbamylalkyle en C_1-C_6 ; un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)carboxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)carbonylalkyle en C_1-C_6 ; un radical N-alkyl(C_1-C_6)carbamylalkyle en C_1-C_6 .
10. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle la paraphénylènediamine tertiaire cationique est telle que D est une simple liaison ou une chaîne alkylène pouvant être substituée.
11. Composition selon l'une des revendications 7 à 9, dans laquelle la paraphénylènediamine tertiaire cationique est telle que R_2 est un radical trialkylammonium.
12. Composition selon l'une des revendications 1 à 6, dans laquelle la paraphénylènediamine tertiaire cationique est telle que R_2 représente le radical onium Z correspondant à la formule III



(III)

dans laquelle

• D est une simple liaison ou une chaîne alkylène en C_1-C_{14} , linéaire ou ramifiée pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi l'oxygène, le soufre ou l'azote, et pouvant être substituée par un ou plusieurs radicaux hydroxyle, alcoxy en C_1-C_6 ou amino, et pouvant porter une ou plusieurs fonctions cétone;

• les sommets E, G, J, L, identiques ou différents, représentent un atome de carbone, d'oxygène, de soufre ou d'azote pour former un cycle pyrrolique, pyrazolique, imidazolique, triazolique, oxazolique, isooxazolique, thiazolique, isothiazolique,

• q est un nombre entier compris entre 0 et 4 inclus ;

• o est un nombre entier compris entre 0 et 3 inclus ;

• q+o est un nombre entier compris entre 0 et 4 ;

• les radicaux R_8 , identiques ou différents, représentent un atome d'halogène, un radical hydroxyle, un radical alkyle en C_1-C_6 , un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 , un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 , un radical alcoxy en C_1-C_6 , un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 , un radical amido, un radical carboxyle, un radical alkylcarbonyle en C_1-C_6 , un radical thio, un radical thioalkyle en C_1-C_6 , un radical alkyl(C_1-C_6)thio, un radical amino, un radical amino mono- ou di- substitué par un radical alkyl(C_1-C_6), alkyl(C_1-C_6)carbonyle, amido, alkyl(C_1-C_6)sulfonyle ; un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 ou un radical polyhydroxyalkyle en C_2-

C₆; étant entendu que les radicaux R₈ sont portés par un atome de carbone,

5 • les radicaux R₉, identiques ou différents, représentent un radical alkyle en C₁-C₆, un radical monohydroxyalkyle en C₁-C₆, un radical polyhydroxyalkyle en C₂-C₆, un radical trialkyl(C₁-C₆)silanealkyle en C₁-C₆, un radical alcoxy(C₁-C₆)alkyle en C₁-C₆, un radical carbamylalkyle C₁-C₆, un radical alkyl(C₁-C₆)carboxyalkyle en C₁-C₆, un radical benzyle ; étant entendu que les radicaux R₉ sont portés par un azote,

10 • R₁₀ représente un radical alkyle en C₁-C₆; un radical monohydroxyalkyle en C₁-C₆; un radical polyhydroxyalkyle en C₂-C₆; un radical aryle ; un radical benzyle ; un radical aminoalkyle en C₁-C₆, un radical aminoalkyle en C₁-C₆ dont l'amine est substituée par un radical alkyl(C₁-C₆), alkyl(C₁-C₆)carbonyle, amido ou alkyl(C₁-C₆)sulfonyle ; un radical carboxyalkyle en C₁-C₆; un radical carbamylalkyle en C₁-C₆; un radical trifluoroalkyle en C₁-C₆; un radical trialkyl(C₁-C₆)silanealkyle en C₁-C₆; un radical sulfonamidoalkyle en C₁-C₆; un radical alkyl(C₁-C₆)carboxyalkyle en C₁-C₆ ; un radical alkyl(C₁-C₆)sulfinylalkyle en C₁-C₆; un radical alkyl(C₁-C₆)sulfonylalkyle en C₁-C₆ ; un radical alkyl(C₁-C₆)carbonylalkyle en C₁-C₆; un radical N-alkyl(C₁-C₆)carbamylalkyle en C₁-C₆; un radical N-alkyl(C₁-C₆)sulfonamidoalkyle en C₁-C₆;

• x est 0 ou 1

25 - lorsque x = 0, le bras de liaison D est rattaché à l'atome d'azote,

- lorsque x = 1, le bras de liaison D est rattaché à l'un des sommets E, G, J ou L,


• Y est un contre-ion.

30 13. Composition selon la revendication 12, dans laquelle la paraphénylènediamine tertiaire cationique est telle que les sommets E, G, J et L forment un cycle imidazolique.

14. Composition selon la revendication 12 ou 13, dans laquelle la paraphénylènediamine tertiaire cationique est telle que x est égal à

0, D est une simple liaison ou une chaîne alkylène pouvant être substituée.

15. Composition selon l'une des revendications 1 à 6, dans laquelle la paraphénylènediamine tertiaire cationique est telle que R₂ représente un radical onium Z correspondant à la formule IV



(IV)

10 dans laquelle :

• D est une simple liaison ou une chaîne alkylène en C₁-C₁₄, linéaire ou ramifiée pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi un atome d'oxygène, de soufre ou d'azote, et pouvant être substituée par un ou plusieurs radicaux hydroxyle, alcoxy en C₁-C₆ ou amino, et pouvant porter une ou plusieurs fonctions cétone;

15 • les sommets E, G, J, L et M identiques ou différents, représentent un atome de carbone, d'oxygène, de soufre ou d'azote pour former un cycle choisi parmi les cycles pyridiniques, pyrimidiniques, pyraziniques, triaziniques et pyridaziniques ;

20 • p est un nombre entier compris entre 0 et 3 inclus ;

• m est un nombre entier compris entre 0 et 5 inclus ;

• p+m est un nombre entier compris entre 0 et 5 ;

25 • les radicaux R₁₁, identiques ou différents, représentent un atome d'halogène, un radical hydroxyle, un radical alkyle en C₁-C₆, un radical monohydroxyalkyle en C₁-C₆, un radical polyhydroxyalkyle en

C₂-C₆, un radical alcoxy en C₁-C₆, un radical trialkyl(C₁-C₆)silanealkyle en C₁-C₆, un radical amido, un radical carboxyle, un radical alkylcarbonyle en C₁-C₆, un radical thio, un radical thioalkyle en C₁-C₆, un radical alkyl(C₁-C₆)thio, un radical amino, un radical amino substitué par un radical alkyl(C₁-C₆), alkyl(C₁-C₆)carbonyle, amido ou alkyl(C₁-C₆)sulfonyle ; un radical monohydroxyalkyle en C₁-C₆ ou un radical polyhydroxyalkyle en C₂-C₆; étant entendu que les radicaux R₁₁ sont portés par un atome de carbone,

• les radicaux R₁₂, identiques ou différents, représentent un radical alkyle en C₁-C₆, un radical monohydroxyalkyle en C₁-C₆, un radical polyhydroxyalkyle en C₂-C₆, un radical trialkyl(C₁-C₆)silanealkyle en C₁-C₆, un radical alcoxy(C₁-C₆)alkyle en C₁-C₆, un radical carbamylalkyle C₁-C₆, un radical alkyl(C₁-C₆)carboxyalkyle en C₁-C₆, un radical benzyle ; étant entendu que les radicaux R₁₂ sont portés par un azote,

• R₁₃ représente un radical alkyle en C₁-C₆ ; un radical monohydroxyalkyle en C₁-C₆ ; un radical polyhydroxyalkyle en C₂-C₆ ; un radical aryle ; un radical benzyle ; un radical aminoalkyle en C₁-C₆, un radical aminoalkyle en C₁-C₆ dont l'amine est mono- ou di-substituée par un radical alkyl(C₁-C₆), alkyl(C₁-C₆)carbonyle, amido ou alkyl(C₁-C₆)sulfonyle ; un radical carboxyalkyle en C₁-C₆ ; un radical carbamylalkyle en C₁-C₆ ; un radical trifluoroalkyle en C₁-C₆ ; un radical trialkyl(C₁-C₆)silanealkyle en C₁-C₆ ; un radical sulfonamidoalkyle en C₁-C₆ ; un radical alkyl(C₁-C₆)carboxyalkyle en C₁-C₆ ; un radical alkyl(C₁-C₆)sulfinylalkyle en C₁-C₆ ; un radical alkyl(C₁-C₆)sulfonylalkyle en C₁-C₆ ; un radical alkyl(C₁-C₆)carbonylalkyle en C₁-C₆ ; un radical N-alkyl(C₁-C₆)carbamylalkyle en C₁-C₆ ; un radical N-alkyl(C₁-C₆)sulfonamidoalkyle en C₁-C₆ ;

• x est 0 ou 1

- lorsque x = 0, le bras de liaison D est rattaché à l'atome d'azote,

- lorsque x = 1, le bras de liaison D est rattaché à l'un des sommets E, G, J, L ou M,

• Y représente un contre ion.

16. Composition selon la revendication 15, dans laquelle les sommets E, G, J, L et M forment avec l'azote du cycle un cycle choisi parmi les cycles pyridiniques et pyrimidiniques.

5 17. Composition selon l'une des revendications 15 à 16, dans laquelle la paraphénylènediamine tertiaire cationique est telle que x est égal à 0 et R_{11} est choisi parmi un radical hydroxyle, un radical alkyle en C_1-C_6 , un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 , un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 , un radical alcoxy en C_1-C_6 , un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 , un radical amido, un radical alkylcarbonyle en C_1-C_6 , un radical amino, un radical amino mono- ou di-substitué par un radical alkyl(C_1-C_6), alkyl(C_1-C_6)carbonyle, amido ou alkyl(C_1-C_6)sulfonyle ; un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 ou un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 et R_{12} est choisi parmi un radical alkyle en C_1-C_6 , un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 , un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 , un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 , un radical alcoxy(C_1-C_6)alkyle en C_1-C_6 , un radical carbamylalkyle C_1-C_6 .

15 18. Composition selon l'une des revendications 15 à 17, dans laquelle la paraphénylènediamine tertiaire cationique est telle que x est égal à 1 et R_{13} est choisi parmi un radical alkyle en C_1-C_6 ; un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 ; un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 ; un radical aminoalkyle en C_1-C_6 , un radical aminoalkyle en C_1-C_6 dont l'amine est mono- ou di-substituée par un radical alkyl(C_1-C_6), alkyl(C_1-C_6)carbonyle, un radical amido ou un radical alkyl(C_1-C_6)sulfonyle ; un radical carbamylalkyle en C_1-C_6 ; un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 ; un radical alkyl(C_1-C_6)carbonylalkyle en C_1-C_6 ; un radical N-alkyl(C_1-C_6)carbamylalkyle en C_1-C_6 ; R_{11} est choisi parmi un radical hydroxyle, un radical alkyle en C_1-C_6 , un radical monohydroxyalkyle en C_1-C_6 , un radical polyhydroxyalkyle en C_2-C_6 , un radical alcoxy en C_1-C_6 , un radical trialkyl(C_1-C_6)silanealkyle en C_1-C_6 , un radical amido, un radical alkylcarbonyle en C_1-C_6 , un radical amino, un radical amino mono- ou di-substitué par un radical alkyl(C_1-C_6), alkyl(C_1-C_6)carbonyle, amido ou alkyl(C_1-C_6)sulfonyle ; et R_{12} est choisi parmi un radical alkyle en

C₁-C₆, un radical monohydroxyalkyle en C₁-C₆, un radical polyhydroxyalkyle en C₂-C₆, un radical trialkyl(C₁-C₆)silanealkyle en C₁-C₆, un radical alcoxy(C₁-C₆)alkyle en C₁-C₆, un radical carbamylalkyle C₁-C₆.

5 19. Composition selon l'une quelconque des revendications 15 à 18, dans laquelle la paraphénylènediamine tertiaire cationique est telle que R₁₁, R₁₂ et R₁₃ sont des radicaux alkyles pouvant être substitués.

10 20. Composition selon l'une des revendications 1 à 6, dans laquelle la paraphénylènediamine tertiaire cationique est telle que le radical R₂ est radical de formule -XP(O)(O-)OCH₂CH₂N⁺(CH₃)₃ où X représente un atome d'oxygène ou un radical-NR₁₄, R₁₄ représentant un hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₄ ou un radical hydroxyalkyle.

15 21. Composition selon l'une des revendications 1 à 6, dans laquelle la paraphénylènediamine tertiaire cationique est un radical guanidine de formule -X-C=NR₁₅-NR₁₆R₁₇, X représente un atome d'oxygène ou un radical -NR₁₈, R₁₅, R₁₆, R₁₇ et R₁₈ représentant un hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₄ ou un radical hydroxyalkyle.

20 22. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la paraphénylène tertiaire cationique est choisie dans le groupe formé par les

[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-triméthyl-ammonium; chlorure,

[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-diméthyl-tetradécyl-ammonium; bromure

25 N'-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-N,N-diméthyl-guanidine

N-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-guanidine

3-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-méthyl-3H-imidazol-1-ium; chlorure

30 [1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-(2-hydroxy-ethyl)-diméthyl-ammonium; chlorure

[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-diméthyl-(3-triméthylsilanyl-propyl)-ammonium ; chlorure

- [1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-(-triméthylammonium-hexyl)-diméthyl-ammonium; dichlorure
- [1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-oxophosphorylcholine
 {2-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yloxy]-ethyl}-triméthyl-
 5 ammonium; chlorure
- 1-{2-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yloxy]-ethyl}-1-méthyl-pyrrolidinium; chlorure
- 3-{3-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yloxy]-propyl}-1-méthyl-3H-imidazol-1-ium ; chlorure
- 10 1-{2-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yloxy]-ethyl}-1-méthyl-piperidinium; chlorure
- 3-{3-[1-(5-triméthylsilanylethyl-4-Amino-3-triméthylsilanylethyl -phényl)-pyrrolidin-3-yloxy]-propyl}-1-méthyl-3H-imidazol-1-um ; chlorure
- 15 [1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-triméthyl-ammonium; chlorure
- [1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-diméthyl-tetradecyl-ammonium; chlorure
- N'-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-N,N-
 20 diméthyl-guanidine
- N-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-guanidine
- 3-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-méthyl-3H-imidazol-1-ium; chlorure
- [1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-(2-hydroxy-ethyl)-diméthyl-ammonium chlorure
- 25 [1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-diméthyl-(3-triméthylsilanyl-propyl ammonium ; chlorure
- [1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-(-triméthylammonium-hexyl)-diméthyl-ammonium dichlorure
- 30 [1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-oxophosphorylcholine
- {2-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yloxy]-ethyl}-triméthyl-ammonium; chlorure

1-{2-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yloxy]-ethyl}-1-méthyl-pyrrolidinium ; chlorure

3-{3-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yloxy]-propyl}-1-méthyl-3H-imidazol-1-um ; chlorure

5 1-{2-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yloxy]-ethyl}-1-méthyl-piperidinium; chlorure

[1-(4-Amino-3-triméthylsilanylethyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-triméthyl-ammonium; chlorure

10 3-[1-(4-Amino-3-triméthylsilanylethyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-méthyl-3H-imidazol-1-ium; chlorure

3-{3-[1-(4-Amino-3-triméthylsilanylethyl-phényl)-pyrrolidin-3-yloxy]-propyl}-1-méthyl-3H-imidazol-1-um ; chlorure

[1-(5-triméthylsilanylethyl-4-Amino-3-triméthylsilanylethyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-triméthyl-ammonium; chlorure

15 3-[1-(5-triméthylsilanylethyl-4-Amino-3-triméthylsilanylethyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-méthyl-3H-imidazol-1-ium; chlorure

1'-(4-Amino-phényl)-1-méthyl-[1,3']bipyrrolidinyl-1-ium; chlorure

20 1'-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-1-méthyl-[1,3']bipyrrolidinyl-1-ium; chlorure

3-{[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-ylcarbamoyl]-méthyl}-1-méthyl-3H-imidazol-1-ium ; chlorure

3-{[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-ylcarbamoyl]-méthyl}-1-méthyl-3H-imidazol-1-ium ; chlorure

25 3-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-(3-triméthylsilanyl-propyl)-3H-imidazol-1-ium ; chlorure

3-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-(3-triméthylsilanyl-propyl)-3H-imidazol-1-ium ; chlorure

30 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-éthyl-diméthyl-ammonium ; chlorure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-éthyl-diméthyl-ammonium; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-propyl-diméthyl-ammonium ; iodure,

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-propyldiméthyl-ammonium ; bromure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-propyldiméthyl-ammonium ; méthosulfate

5 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-butyldiméthyl-ammonium; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-pentyldiméthyl-ammonium ; iodure

10 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hexyldiméthyl-ammonium; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-heptyldiméthyl-ammonium ; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-octyldiméthyl-ammonium ; iodure

15 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-décyldiméthyl-ammonium ; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hexadécyldiméthyl-ammonium ; iodure

20 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hydroxyéthyl-diméthyl-ammonium ; chlorure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hydroxyéthyl-diméthyl-ammonium ; iodure.

25 23. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle la paraphénylène tertiaire cationique est choisie dans le groupe formé par [1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-triméthyl-ammonium; chlorure ;

[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-diméthyl-tetradécyl-ammonium; bromure ;

30 N'-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-N,N-diméthyl-guanidine.

N-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-guanidine

3-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-méthyl-3H-imidazol-1-ium; chlorure ;

- [1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-(2-hydroxy-ethyl)-
diméthyl-ammonium; chlorure
- [1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-diméthyl-(3-
triméthylsilanyl-propyl)-ammonium ; chlorure ;
- 5 [1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-triméthyl-
ammonium; chlorure
- [1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-diméthyl-
tetradecyl-ammonium; chlorure
- 10 N'-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-N,N-
diméthyl-guanidine
- N-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-guanidine
- 3-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-méthyl-3H-
imidazol-1-ium; chlorure
- [1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-(2-hydroxy-
ethyl)-diméthyl-ammonium chlorure
- 15 [1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-diméthyl-(3-
triméthylsilanyl-propyl ammonium ; chlorure
- 1'-(4-Amino-phényl)-1-méthyl-[1,3']bipyrrolidinyl-1-ium;
chlorure
- 20 1'-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-1-méthyl-[1,3']bipyrrolidinyl-1-
ium; chlorure
- 3-{[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-ylcarbamoyl]-méthyl}-1-
méthyl-3H-imidazol-1-ium ; chlorure
- 3-{[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-ylcarbamoyl]-
méthyl}-1-méthyl-3H- imidazol-1-ium ; chlorure
- 25 3-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-(3-triméthylsilanyl-
propyl)-3H-imidazol-1-ium ; chlorure
- 3-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-(3-
triméthylsilanyl-propyl)-3H-imidazol-1-ium ; chlorure
- 30 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-éthyl diméthyl-
ammonium ; chlorure
- [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-éthyl diméthyl-
ammonium ; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-propyldiméthyl-ammonium ; iodure,

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-propyldiméthyl-ammonium ; bromure

5 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-propyldiméthyl-ammonium ; méthosulfate

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-butyldiméthyl-ammonium ; iodure

10 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-pentyldiméthyl-ammonium ; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hexyldiméthyl-ammonium ; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-heptyldiméthyl-ammonium ; iodure

15 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-octyldiméthyl-ammonium ; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-décyldiméthyl-ammonium ; iodure

20 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hexadécyldiméthyl-ammonium ; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hydroxyéthyl-diméthyl-ammonium ; chlorure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hydroxyéthyl-diméthyl-ammonium ; iodure.

25 24. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la paraphénylène tertiaire cationique est choisie dans le groupe formé par [1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-triméthyl-ammonium; chlorure

30 [1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-diméthyl-tetradécyl-ammonium; bromure

N'-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-N,N-diméthyl-guanidine

N-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-guanidine

3-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-méthyl-3H-imidazol-1-ium; chlorure

[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-(2-hydroxy-ethyl)-diméthyl-ammonium; chlorure

5 [1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-diméthyl-(3-triméthylsilanyl-propyl)-ammonium ; chlorure

[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-(-triméthylammonium-hexyl)-diméthyl-ammonium; dichlorure

10 1'-(4-Amino-phényl)-1-méthyl-[1,3']bipyrrolidiny-1-ium; chlorure

3-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-(3-triméthylsilanyl-propyl)-3H-imidazol-1-ium ; chlorure

3-[1-(4-Amino-3-méthyl-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-(3-triméthylsilanyl-propyl)-3H-imidazol-1-ium ; chlorure

15 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-éthyldiméthyl-ammonium ; chlorure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-éthyldiméthyl-ammonium ; iodure

20 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-propyldiméthyl-ammonium ; iodure,

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-propyldiméthyl-ammonium ; bromure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-propyldiméthyl-ammonium ; méthosulfate

25 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-butyldiméthyl-ammonium ; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-pentyldiméthyl-ammonium ; iodure

30 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hexyldiméthyl-ammonium ; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-heptyldiméthyl-ammonium ; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-octyldiméthyl-ammonium ; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-décyldiméthyl-ammonium ; iodure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hexadécyldiméthyl-ammonium ; iodure

5 [1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hydroxyéthyl-diméthyl-ammonium ; chlorure

[1-(4-amino-phényl)-pyrrolidine-3-yl]-hydroxyéthyl-diméthyl-ammonium ; iodure.

10 25. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la paraphénylène tertiaire cationique est choisie dans le groupe formé par les

[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-triméthyl-ammonium; chlorure

15 3-[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-1-méthyl-3H-imidazol-1-ium; chlorure


[1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-(2-hydroxy-éthyl)-diméthyl-ammonium; chlorure

1'-(4-Amino-phényl)-1-méthyl-[1,3']bipyrrolidinyl-1-ium; chlorure.

20 26. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la paraphénylène tertiaire cationique est choisie dans le groupe formé par les

25 [1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-triméthyl-ammonium; chlorure, et [1-(4-Amino-phényl)-pyrrolidin-3-yl]-(2-hydroxy-éthyl)-diméthyl-ammonium; chlorure.

27. Composition selon l'une des revendications 1 à 26 dans laquelle le polymère à chaîne grasse cationique est un polyuréthane associatif cationique de formule générale (Va) :



dans laquelle :

R et R', identiques ou différents, représentent un groupement hydrophobe ou un atome d'hydrogène ;

X et X', identiques ou différents, représentent un groupement comportant une fonction amine portant ou non un groupement hydrophobe, ou encore le groupement L" ;

5 L, L' et L", identiques ou différents, représentent un groupement dérivé d'un diisocyanate ;

P et P', identiques ou différents, représentent un groupement comportant une fonction amine portant ou non un groupement hydrophobe ;

Y représente un groupement hydrophile ;

10 r est un nombre entier compris entre 1 et 100, de préférence entre 1 et 50 et en particulier entre 1 et 25,

n, m, et p valent chacun indépendamment des autres entre 0 et 1000 ;


15 la molécule contenant au moins une fonction amine protonée ou quaternisée et au moins un groupement hydrophobe.

28. Composition selon la revendication 27 caractérisée par le fait R et R' représentent tous les deux indépendamment un groupement hydrophobe, X, X' représentent chacun un groupe L'', n et p valent entre 1 et 1000.

20 29. Composition selon la revendication 27, caractérisée par le fait que R et R' représentent tous les deux indépendamment un groupement hydrophobe, X et X' représentent tous les deux indépendamment un groupement comportant une amine quaternaire, n et p valent zéro.

25 30. Composition selon l'une quelconque des revendications 27 à 29, caractérisée par le fait que R et R' représentent un radical ou un polymère à chaîne hydrocarbonée, saturée ou non, linéaire ou ramifiée, dans laquelle un ou plusieurs des atomes de carbone peut être remplacé par un hétéroatome choisi parmi S, N, O et P, ou à chaîne siliconée ou perfluorée.

30 31. Composition selon l'une quelconque des revendications 27 à 30, caractérisée par le fait que X et X' représentent l'une des formules :




dans lesquelles :

5 R_2 représente un radical alkylène ayant de 1 à 20 atomes de carbone, linéaire ou ramifié, comportant ou non un cycle saturé ou insaturé, ou un radical arylène, un ou plusieurs des atomes de carbone pouvant être remplacé par un hétéroatome choisi parmi N, S, O, P ;

10 R_1 et R_3 , identiques ou différents, désignent un radical alkyle ou alcényle en C_1 - C_{30} , linéaire ou ramifié, un radical aryle, l'un au moins des atomes de carbone pouvant être remplacé par un hétéroatome choisi parmi N, S, O, P ;

A^- est un contre-ion physiologiquement acceptable.

32.Composition selon l'une quelconque des revendications 27 à 31, caractérisée par le fait que les groupements L, L' et L'', identiques ou différents, représentent la formule :




dans laquelle :

Z représente -O-, -S- ou -NH- ; et

20 R_4 représente un radical alkylène ayant de 1 à 20 atomes de carbone, linéaire ou ramifié, comportant ou non un cycle saturé ou non saturé, un radical arylène, un ou plusieurs des atomes de carbone pouvant être remplacé par un hétéroatome choisi parmi N, S, O et P.

33.Composition selon l'une quelconque des revendications 27 à 32, caractérisée par le fait que les groupements P et P', identiques ou différents, représentent au moins l'une des formules suivantes :



dans lesquelles :

R_5 et R_7 ont les mêmes significations que R_2 ;

R_6 , R_8 et R_9 ont les mêmes significations que R_1 et R_3 ;

- 5 R_{10} représente un groupe alkylène, linéaire ou ramifié, éventuellement insaturé et pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi N, O, S et P, et

A^- est un contre-ion physiologiquement acceptable.

- 10 34. Composition selon l'une quelconque des revendications 27 à 33, caractérisée par le fait que Y représente un groupe dérivé d'éthylèneglycol, de diéthylèneglycol ou de propylèneglycol, ou un groupe dérivé d'un polymère choisi parmi les polyéthers, les polyesters sulfonés et les polyamides sulfonés.

- 15 35. Composition selon l'une quelconque des revendications 27 à 34, caractérisée par le fait que les polyuréthanes associatifs cationiques ont une masse moléculaire moyenne en nombre comprise entre 400 et 500000, de préférence entre 1000 et 400000 et en particulier entre 1000 et 300000.

- 20 36. Composition selon l'une des revendications 1 à 26 dans laquelle le polymère à chaîne grasse cationique est une cellulose cationique à chaîne grasse.



37. Composition selon la revendication 36 dans laquelle la cellulose cationique à chaîne grasse est choisie parmi les celluloses quaternisées modifiées par des groupements comportant au moins une chaîne grasse, choisis parmi les groupes alkyles, arylalkyles, alkylaryles comportant de 8 à 30 atomes de carbone, ou des mélanges de ceux-ci.

38. Composition selon l'une des revendications 1 à 26 dans laquelle le polymère à chaîne grasse cationique est un dérivé de polyvinylpyrrolidone cationique à chaîne grasse.

39. Composition selon la revendication 38 dans laquelle le dérivé de polyvinylpyrrolidone cationique à chaîne grasse comprend :

- au moins un monomère de type vinylpyrrolidone cationique à chaîne grasse

- au moins un monomère de structure (I) ou (II) suivantes :




dans lesquelles :

X désigne un atome d'oxygène ou un radical NR_6 ,

R_1 et R_6 désignent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un radical alkyl linéaire ou ramifié en C_1 - C_5 ,

R_2 désigne un radical alkyle linéaire ou ramifié en C_1 - C_4 ,

R_3 , R_4 et R_5 désignent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène, un radical alkyle linéaire ou ramifié en C_1 - C_{30} ou un radical de formule (III) :



Y , Y_1 et Y_2 désignent, indépendamment l'un de l'autre, un radical alkylène linéaire ou ramifié en C_2 - C_{16} .

R₇ désigne un atome d'hydrogène, ou un radical alkyle linéaire ou ramifié en C₁-C₄ ou un radical hydroxyalkyle linéaire ou ramifié en C₁-C₄.

5 R₈ désigne un atome d'hydrogène ou un radical alkyle linéaire ou ramifié en C₁-C₃₀,

p, q et r désignent, indépendamment l'un de l'autre, soit la valeur zéro, soit la valeur 1,

m et n désignent, indépendamment l'un de l'autre, un nombre entier allant de 0 à 100,

10 x désigne un nombre entier allant de 1 à 100,

Z désigne un anion d'acide organique ou minéral,

sous réserve que :

- l'un au moins des substituants R₃, R₄, R₅ ou R₈ désigne un radical alkyle linéaire ou ramifié en C₉-C₃₀,

15 - si m ou n est différent de zéro, alors q est égal à 1,

- si m ou n sont égaux à zéro, alors p ou q est égal à 0.

40. Composition selon la revendication 39, caractérisée par le fait que dans les formules (I) ou (II), les radicaux R₃, R₄, R₅ désignent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un radical alkyle linéaire ou ramifié en C₁-C₃₀.

41. Composition selon la revendication 39 ou 40, caractérisée par le fait que le monomère b) est un monomère de formule (I).

42. Composition selon la revendication 41, caractérisée par le fait que dans la formule (I), m et n sont égaux à zéro.

25 43. Composition selon l'une quelconque des revendications 39 à 42, caractérisée par le fait que le ou les polymères poly(vinylpyrrolidone) cationiques contiennent un ou plusieurs monomères supplémentaires cationiques ou non ioniques.

30 44. Composition selon la revendication 43, caractérisée par le fait que le poly(vinylpyrrolidone) cationique est un terpolymère comprenant :

a)-un monomère de type pyrrolidone,

b)-un monomère de formule (I) dans laquelle p=1, q=0, R₃ et R₄ désignent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène

ou un radical alkyle en C₁-C₅ et R₅ désigne un radical alkyle en C₉-C₂₄ et

5 c)-un monomère de formule (II) dans laquelle R₃ et R₄ désignent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₅.

45.Composition selon la revendication 44, caractérisée par le fait que le terpolymère comprend en poids, 40 à 95% de monomère (a), 0,25 à 50% de monomère (b) et 0,1 à 55% de monomère (c).

10 46.Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que les poly(vinylpyrrolidone) cationiques sont choisis parmi les terpolymères vinylpyrrolidone / diméthylaminopropylméthacrylamide / tosylate de
15 dodécyldiméthylméthacrylamidopropylammonium, les terpolymères vinylpyrrolidone / diméthylaminopropylméthacrylamide / tosylate de cocoyldiméthylméthacrylamidopropylammonium, les terpolymères vinylpyrrolidone / diméthylaminopropylméthacrylamide / tosylate ou
chlorure de lauryldiméthylméthacrylamidopropylammonium.

20 47.Composition selon l'une quelconque des revendications 39 à 46, caractérisée par le fait que la masse moléculaire en poids des poly(vinylpyrrolidone) cationiques est comprise entre 500 et 20 000 000, de préférence comprise entre 200 000 et 2 000 000 et plus préférentiellement comprise entre 400 000 et 800 000.


25 48.Composition selon l'une des revendications 1 à 26 dans laquelle le polymère à chaîne grasse est un polymère amphiphile anionique comportant au moins un motif hydrophile choisi parmi les motifs acide acrylique et acide méthacrylique et au moins un motif hydrophobe choisi parmi les motifs de type ester d'alkyle (C₁₀-C₃₀) d'acide acrylique et de type ester d'alkyle (C₁₀-C₃₀) d'acide méthacrylique.

30 49.Composition selon la revendication 48 telle que le motif hydrophobe du polymère amphiphile anionique est choisi parmi les motifs de type ester d'alkyle (C₁₂-C₂₂) d'acide acrylique et de type ester d'alkyle (C₁₂-C₂₂) d'acide méthacrylique.

50. Composition selon la revendication 48 telle que le polymère amphiphile anionique est un polymère d'acide acrylique et de méthacrylate de lauryle.

5 51. Composition selon l'une des revendications 1 à 26 dans laquelle le polymère à chaîne grasse anionique est un polymère amphiphile anionique comportant au moins un motif hydrophile de type acide acrylique et au moins un motif éther allyl à chaîne grasse.

10 52. Composition selon la revendication 51, caractérisée par le fait que le motif éther d'allyl à chaîne grasse correspond au monomère de formule (I) suivante :



15 dans laquelle R' désigne H ou CH₃, B désigne le radical éthylèneoxy, n est nul ou désigne un entier allant de 1 à 100, R désigne un radical hydrocarboné choisi parmi les radicaux alkyl, arylalkyl, aryl, alkylaryl, cycloalkyl, comprenant de 8 à 30 atomes de carbone.

20 53. Composition selon la revendication 52, caractérisée par le fait que le radical hydrocarboné est alkyl ou alkylaryl et comprend de 10 à 24 atomes de carbone.

54. Composition selon l'une des revendications 52 ou 53, caractérisée par le fait que dans la formule (I), R' désigne H, n est égal à 10 et R désigne un radical stéaryl.

25 55. Composition selon l'une des revendications précédentes dans laquelle la ou les paraphénylènediamines tertiaires cationiques à noyau pyrrolidinique représentent de 0,001 à 10% et de préférence de 0,005 à 6% en poids par rapport au poids total de la composition.

30 56. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le polymère à chaîne grasse représente de 0,05% à 20%, de préférence de 0,1% à 10% et de manière préférée de 0,5% à 5% en poids par rapport au poids total de la composition.

57. Composition selon l'une des revendications précédentes telle qu'elle contient en outre au moins un polymère cationique additionnel.

58. Composition selon l'une des revendications précédentes telle qu'elle contient en outre au moins un polymère épaississant additionnel.

5 59. Composition selon l'une des revendications précédentes telle qu'elle contient en outre au moins un tensioactif choisi dans le groupe formé par les tensioactifs anioniques, les tensioactifs amphotères ou zwitterioniques, les tensioactifs non ioniques et les tensioactifs cationiques.

10 60. Composition selon l'une des revendications précédentes telle qu'elle comprend au moins une base d'oxydation additionnelle autre que les paraphénylènediamines tertiaires cationiques à noyau pyrrolidinique choisie parmi les paraphénylènediamines, les bis-phénylalkylènediamines, les paraaminophénols, les orthoaminophénols, les bases hétérocycliques et leurs sels d'addition.

15 61. Composition selon la revendication 60, dans laquelle la ou les bases d'oxydation additionnelles sont présentes en une quantité comprise entre 0,001 à 20 % en poids et de préférence entre 0,005 et 6 % en poids par rapport au poids total de la composition.

20 62. Composition selon l'une des revendications précédentes telle qu'elle comprend en outre au moins un coupleur choisi parmi les métaphénylènediamines, les métaaminophénols, les métadiphénols, les coupleurs naphthaléniques, les coupleurs hétérocycliques et leurs sels d'addition.

25 63. Composition selon la revendication 62 telle que le coupleur choisi parmi le 1,3-dihydroxy benzène, le 1,3-dihydroxy 2-méthyl benzène, le 4-chloro 1,3-dihydroxy benzène, le 2,4-diamino 1-(β -hydroxyéthoxy) benzène, le 2-amino 4-(β -hydroxyéthylamino) 1-méthoxybenzène, le 1,3-diamino benzène, le 1,3-bis-(2,4-diaminophénoxy) propane, la 3-uréido aniline, le 3-uréido 1-diméthylamino benzène, le sésamol, le 1- β -hydroxyéthylamino-3,4-méthylènedioxybenzène, l' α -naphтол, le 2 méthyl-1-naphтол, le 6-hydroxy indole, le 4-hydroxy indole, le 4-hydroxy N-méthyl indole, la 2-amino-3-hydroxy pyridine, la 6-hydroxy benzomorpholine la 3,5-diamino-2,6-diméthoxy pyridine, le 1-N-(β -hydroxyéthyl)amino-3,4-

30

méthylène dioxybenzène, le 2,6-bis-(β -hydroxyéthylamino)toluène et leurs sels d'addition.

5 64.Composition selon la revendication 62 ou 63, telle que le ou les coupleurs sont présents en une quantité comprise entre 0,001 et 20 % de préférence entre 0,005 et 6 % en poids par rapport au poids total de la composition.

65.Composition selon l'une des revendications précédentes telle qu'elle comprend en outre au moins un colorant direct.

10 66.Composition selon l'une des revendications précédentes telle qu'elle comprend en outre au moins un solvant hydroxylé tel que l'éthanol, le propylène glycol, le glycérol, les mono- éthers de polyols.

15 67.Composition selon l'une des revendications précédentes telle qu'elle comprend un agent oxydant choisi parmi le peroxyde d'hydrogène, le peroxyde d'urée, les bromates de métaux alcalins, les persels, les peracides et les enzymes oxydases, et de préférence le peroxyde d'hydrogène.

20 68.Procédé de teinture d'oxydation des fibres kératiniques, caractérisé en ce qu'on applique sur les fibres une composition tinctoriale telle que définie dans l'une quelconque des revendications 1 à 66 en présence d'un agent oxydant.

25 69.Dispositif à plusieurs compartiments dans lequel le premier compartiment contient une composition tinctoriale pour la teinture des fibres kératiniques, telle que définie à l'une quelconque des revendications 1 à 66 et un deuxième compartiment contient un agent oxydant.

THIS PAGE BLANK (USPTO)